COMUNE DI AREZZO

PROGETTO
INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E
MANUTENZIONE.

TERRE REGIONALI TOSCANE

REGIONE TOSCANA
Patrimonio Agricolo Forestale Regionale

COMPLESSO ALPE DI POTI

Dott. For. Paolo Toccafondi – Dott. For. Simone Pinzauti

VISTO:
Il Comune di Arezzo

DATA: ottobre 2023

Particella fisiocratica chiavePF 006A001

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	25.0886

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie miste in gestione ordinaria	14,722249743478239	006A00101
02	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	3,027186541339947	006A00102
03	Cedui in evoluzione controllata	1,284669826241583	006A00103
04	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	6,456896221330948	006A00104

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
006A009	area di sosta attrezzata
006A010	area di sosta attrezzata

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	14.722249743478239

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie miste in gestione

Altitudine massima	611	Altitudine minima	498
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	94
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	81 - 100
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Leccio
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Leccio	Specie accessoria 2	Orniello
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Cedro dell'Atlante

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere e latifoglie con pino nero e leccio di impianto, il leccio è presente sia a file che per picc fitosanitario.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	401-450 mc/ha
Altezza dominante	24
Diametro medio	21
Provvigione a ha	432
Incremendo medio	4.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	46
Provvigione totale	30

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0010100004	Numero	00004

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	04	N. modulo intervento	005
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie miste di conifere e latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDM		
Compresa	Fustaie miste in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	95
Provvigione ha	433	Provvigione ha all'anno	438
Ripresa ha anno	125	Classe di ripresa	101-125 mc
Ripresa totale all'anno	1845	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.027186541339947

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	495	Altitudine minima	461
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	95
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	5
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cipresso comune
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Acero campestre
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cipresso comune	Specie accessoria 2	Cipresso arizonica
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	Cerro

Descrizione libera	Fustaia a densità disforme a prevalenza di pino nero con cipresso comune, cipresso dell'arizona, cedro e abete d varie.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	28
Diametro medio	23
Provvigione a ha	261
Incremendo medio	3.78
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	300 - 600
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	25
Provvigione totale	32

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.284669826241583

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	550	Altitudine minima	509
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	22
Uso forestale	Ceduo di latifoglie varie	Classe di età	21 - 30
Composizione	Misto	Percentuale conifere	30
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	70
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cipresso comune	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Soprassuolo giovanile a prevalenza di cerro e orniello derivante da incendio. Lungo strada è presente una fascia d dell'Atlante.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	6.456896221330948

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	552	Altitudine minima	480
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	94
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	81 - 100
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cipresso comune
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cipresso comune	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di conifere varie con cipresso comune, cedro dell'Atlante e pino nero e sporadiche latifoglie a densità rada.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A002

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	26.5177

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	9,74590752249228	006A00201
02	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	8,495996694363628	006A00202
03	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	4,492096298047372	006A00203
04	Altre superfici in evoluzione controllata	0,204460799652897	006A00204
05	Fustaie miste in evoluzione controllata	3,1768481763551017	006A00205

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	9.74590752249228

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	601	Altitudine minima	496
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	94
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	81 - 100
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cipresso comune
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Cerro	Seconda specie in rinnovazione	Orniello
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cipresso comune	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia coetanea a prevalenza di pino nero. Sottocopertura è presente rinnovazione affermata di orniello, leccio cerro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	651-700 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	23
Provvigione a ha	700
Incremendo medio	8.2
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	6822

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0020100015	Numero	00015

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	15	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	97
Provvigione ha	700	Provvigione ha all'anno	721
Ripresa ha anno	295	Classe di ripresa	276-300 mc
Ripresa totale all'anno	2876	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	8.495996694363628

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	572	Altitudine minima	468
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	89
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	81 - 100
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cipresso comune
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Leccio	Seconda specie in rinnovazione	Orniello
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cipresso comune	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di conifere varie con latifoglie d'invasione con rocciosità ameliorante e rinnovazione di leccio, orniello e lati varie.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.492096298047372

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	513	Altitudine minima	454
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	64
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	51 -
Composizione	Mista	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cipresso comune	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	Roverella
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia rada di conifere varie con cipresso comune, cedro dell'Atlante e pino nero. Molte piante morte di pino ne rocciosi.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	24
Diametro medio	26
Provvigione a ha	250
Incremendo medio	5
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	40
Provvigione totale	1037

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.204460799652897

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	500	Altitudine minima	484
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Neoformazione forestale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.1768481763551017

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	630	Altitudine minima	558
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cipresso comune
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Leccio	Seconda specie in rinnovazione	Orniello
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cipresso comune	Specie accessoria 2	Carpino nero
Specie principale 3	Cerro	Specie accessoria 3	Orniello

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere e latifoglie con pino nero, cedro, roverella, cerro e carpino nero. Il cedro si presenta co lecco.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	19
Diametro medio	18
Provvigione a ha	300
Incremendo medio	5.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1500 - 2000
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	40
Provvigione totale	93

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0020500110	Numero	00110

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	B0	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	69
Provvigione ha	690	Provvigione ha all'anno	690
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	127	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.10616746713621501

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	465	Altitudine minima	461
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Area interclusa in zona stradale

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A003

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	25.4654

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie miste in evoluzione controllata	5,68435956643541	006A00301
02	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	3,6789073718626137	006A00302
03	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	1,9462164997766729	006A00303
04	Altre superfici in evoluzione controllata	0,44354440487741403	006A00304
05	Fustaie miste in evoluzione controllata	4,795033646760363	006A00305

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
006A001	laghetto antincendio
006A002	laghetto antincendio

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia
006A001	La Valle
006A002	La Casina
006A005	La Valle

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	5.68435956643541

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	651	Altitudine minima	560
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cipresso comune
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Leccio	Seconda specie in rinnovazione	Orniello
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cipresso comune	Specie accessoria 2	Orniello
Specie principale 3	Cerro	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere e latifoglie con pino nero, cedro, roverella, cerro e carpino nero. Il cedro si presenta co lecco.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dato piano precedente
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	19
Diametro medio	18
Provvigione a ha	300
Incremendo medio	5.5
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1500 - 2000 piante/ha
Altezza media	22
Area basimetrica ad ha	40
Provvigione totale	1443

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0030100111	Numero	00111

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	B1	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	69
Provvigione ha	690	Provvigione ha all'anno	690
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	227	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.6789073718626137

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	588	Altitudine minima	526
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	62
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cipresso comune	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia a prevalenza di Pino nero con Cipresso comune, in buona parte diradata, con vuoti dovuti a mortalità di Pino

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0030200112	Numero	00112

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	B2	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	62
Provvigione ha	680	Provvigione ha all'anno	680
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	147	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.9462164997766729

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	568	Altitudine minima	487
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Roverella
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	Acero campestre
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di latifoglie varie a prevalenza di roverella con orniello, acero e carpino nero. Sotto c sviluppo.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0030300113	Numero	00113

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	B3	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella >50	Età prevalente	60
Provvigione ha	280	Provvigione ha all'anno	280
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	58	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.44354440487741403

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	588	Altitudine minima	561
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Rovere
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Orniello	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Rovere	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cerro	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.795033646760363

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	650	Altitudine minima	578
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cipresso comune	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero diradata recentemente a prevalenza di pino nero con cipresso comune e cedro dell'Atlante.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0030500077	Numero	00077

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	77	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	59
Provvigione ha	590	Provvigione ha all'anno	590
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	141	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.738186403081566

Legge 39	Impianto per arboricoltura
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	650	Altitudine minima	639
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	non pertinente	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Impianti artificiali		
Specie principale 1	Noce	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.261997978817674

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	651	Altitudine minima	643
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Lagheto AIB con relativa area di rispetto

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.793320162215235

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	568	Altitudine minima	534
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Eccessivo	Giacitura	mediocre
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Incolto		
Specie principale 1	Olivo	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.147545844720141

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	613	Altitudine minima	607
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Edificio La Casina, non in uso

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.0817678398486

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	485	Altitudine minima	480
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Lagheto AIB con relativa area di rispetto

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.869889982479965

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	519	Altitudine minima	484
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di latifoglie varie a prevalenza di roverella con orniello, acero e carpino nero. Sotto c sviluppo.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	5.398569679063804

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	534	Altitudine minima	450
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	62
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia a densità disforme, a tratti molto rada per mortalità del Pino nero e, particolarmente, del Cedro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dato piano precedente
Classe di provvigione	151-200 mc/ha
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0031200114	Numero	00114

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	B4	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	62
Provvigione ha	680	Provvigione ha all'anno	680
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	216	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.042397780748829

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	636	Altitudine minima	634
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Leccio	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.457889927989958

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	569	Altitudine minima	542
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Area urbanizzata con vari edifici, denominata La Valle

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.17645373659824398

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	651	Altitudine minima	636
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	b
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	a
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	d
Marginabilità	assente	Frammentazione	a
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Prateria a graminacee con interclusioni arboree a latifoglie		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0031500138	Numero	00138

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	D8	N. modulo intervento	013
Tipologia intervento	Miglioramento prato-pascolo		
Descrizione intervento	Manutenzione dei prati mediante sfalcio.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	1
Turno	1		
Etichetta	MNTP		
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 006A004

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	31.6666

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	2,265763459737157	006A00401
02	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	0,832682817675151	006A00402
03	Fustaie miste in evoluzione controllata	1,3950710791274932	006A00403
04	Pascoli, coltivi e altre aree aperte	0,33188536537631297	006A00404
05	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,723449486033788	006A00405

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
006A011	area di sosta attrezzata

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia
006A006	Il Ciliegino

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	2.265763459737157

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	590	Altitudine minima	540
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	94
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	81 - 100
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Leccio	Seconda specie in rinnovazione	Orniello
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cipresso comune	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia irregolare mista di conifere varie con pino nero e cedro dell'Atlante, cipresso comune, pino marittimo. La scarsa.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	23
Provvigione a ha	260
Incremendo medio	3
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	34
Provvigione totale	1048

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0040100115	Numero	00115

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	B5	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Età prevalente	94
Provvigione ha	850	Provvigione ha all'anno	850
Ripresa ha anno	50	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	113	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.832682817675151

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	648	Altitudine minima	615
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	20
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	80
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Roverella	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia irregolare rada e degradata di fertilità scadente con residuali piante di pino nero e roverella.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.3950710791274932

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	650	Altitudine minima	586
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Carpino nero
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di Pino nero con latifoglie spontanee che si sviluppano fino nel piano intermedio

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.33188536537631297

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	494	Altitudine minima	483
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	collettori di decantazio
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Pascoli abbandonati		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0040400139	Numero	00139

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	D9	N. modulo intervento	013
Tipologia intervento	Miglioramento prato-pascolo		
Descrizione intervento	Manutenzione dei prati mediante sfalcio.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	1
Turno	1		
Etichetta	MNTP		
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.723449486033788

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	557	Altitudine minima	541
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	64
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	Roverella
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero in purezza.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	451-500 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	23
Provvigione a ha	476
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	344

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0040500017	Numero	00017

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	17	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2028	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	68
Provvigione ha	476	Provvigione ha all'anno	504
Ripresa ha anno	219	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	158	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.058030243199749

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	541	Altitudine minima	537
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Area edificata e pertinenze: denominata il Ciliegino

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.66594875742707

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	498	Altitudine minima	436
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	89
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	81 - 100
Composizione	Mista	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	Roverella
Specie principale 3	Cipresso comune	Specie accessoria 3	Cerro

Descrizione libera	Soprassuolo misto di conifere con pino marittimo, cedro dell'Atlante, pino nero e localmente cipresso comune a latifoglie.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dato piano precedente
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	19
Diametro medio	22
Provvigione a ha	260
Incremendo medio	3.5
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200 piante/ha
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	32
Provvigione totale	1330

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0040700116	Numero	00116

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	B6	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Età prevalente	89
Provvigione ha	850	Provvigione ha all'anno	850
Ripresa ha anno	50	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	233	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.257378508268204

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Sociale e culturale
Compresa	Boschi con funzione turistico-ricreativa

Altitudine massima	498	Altitudine minima	489
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	64
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia adulta di Pino nero con ampia chiarìa a copertura erbacea

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0040800078	Numero	00078

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	78	N. modulo intervento	008
Tipologia intervento	Manutenzione aree e punti di sosta		
Descrizione intervento	Taglio degli alberi pericolanti con sfalcio dell'erba e decespugliamento.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	1
Turno	1		
Etichetta	MGLT		
Compresa	Boschi con funzione turistico-ricreativa		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	64
Provvigione ha	705	Provvigione ha all'anno	705
Ripresa ha anno	1	Classe di ripresa	0- 25 mc
Ripresa totale all'anno	1	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.7673458171499872

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	510	Altitudine minima	430
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di latifoglie che si sviluppa nella parte prossima all'impluvio

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1500 - 2000 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.317128055738153

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	646	Altitudine minima	573
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero pura caratterizzata da densità e sviluppo disformi. Le condizioni migliori si riscontrano in pro impluvi.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	23
Provvigione a ha	400
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	920

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0041000018	Numero	00018

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	18	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2028	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	63
Provvigione ha	439	Provvigione ha all'anno	466
Ripresa ha anno	191	Classe di ripresa	176-200 mc
Ripresa totale all'anno	442	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	11.478691044072965

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	552	Altitudine minima	446
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	89
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	81 - 100
Composizione	Mista	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	Roverella
Specie principale 3	Cipresso comune	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere varie con pino nero, cedro dell'Atlante e cipresso comune.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	351-400 mc/ha
Altezza dominante	24
Diametro medio	27
Provvigione a ha	360
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	42
Provvigione totale	4100

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0041100117	Numero	00117

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	B7	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Età prevalente	89
Provvigione ha	850	Provvigione ha all'anno	850
Ripresa ha anno	50	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	575	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	4.166359053336094

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	537	Altitudine minima	464
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	Cerro
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Orniello

Descrizione libera	Fustaia a prevalenza di pino nero con cedro dell'Atlante e latifoglie varie di media fertilità.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	501-550 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	23
Provvigione a ha	514
Incremendo medio	7.4
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	2141

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0041200021	Numero	00021

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	21	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2029	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	74
Provvigione ha	514	Provvigione ha all'anno	549
Ripresa ha anno	225	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	938	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.893006517596263

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	545	Altitudine minima	509
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	94
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	81 - 100
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cerro	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di impianto di conifere e latifoglie, con buon sviluppo delle seconde

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0041300118	Numero	00118

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	B8	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	94
Provvigione ha	780	Provvigione ha all'anno	780
Ripresa ha anno	50	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	44	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 006A005

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	42.0168

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	3,162351025165631	006A00501
02	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	2,295704367963667	006A00502
03	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	2,143437167122601	006A00503
04	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,693754061139103	006A00504
05	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	3,495744764416903	006A00505

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	3.162351025165631

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	648	Altitudine minima	609
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	89
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	81 - 100
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Cerro	Seconda specie in rinnovazione	Roverella
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	Roverella
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia coetanea a prevalenza di pino nero di discreta fertilità con rinnovazione diffusa di cerro, roverella e latifo varie.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	451-500 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	28
Provvigione a ha	490
Incremendo medio	6.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	22
Area basimetrica ad ha	52
Provvigione totale	4000

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0050100119	Numero	00119

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	B9	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	89
Provvigione ha	850	Provvigione ha all'anno	850
Ripresa ha anno	50	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	158	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.295704367963667

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	648	Altitudine minima	535
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Rilevante (tra 60 e 80 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 -
Composizione	Mista	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di fertilità scadente mista con cerro e roverella, caratterizzata da densità disforme a t folto.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0050200120	Numero	00120

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	C0	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella >50	Età prevalente	69
Provvigione ha	320	Provvigione ha all'anno	320
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	69	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.143437167122601

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	530	Altitudine minima	467
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cipresso comune
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cipresso comune	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con cipresso comune a densità disforme a tratti lacunosa con suolo superficiale. Densità e s impluvi.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	401-450 mc/ha
Altezza dominante	25
Diametro medio	23
Provvigione a ha	439
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	940

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0050300022	Numero	00022

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	22	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2029	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	64
Provvigione ha	439	Provvigione ha all'anno	473
Ripresa ha anno	194	Classe di ripresa	176-200 mc
Ripresa totale all'anno	416	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.693754061139103

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	526	Altitudine minima	489
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Assente	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	57
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia di buon sviluppo a densità colma.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	501-550 mc/ha
Altezza dominante	33
Diametro medio	30
Provvigione a ha	666
Incremendo medio	1
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	28
Area basimetrica ad ha	60
Provvigione totale	960

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0050400023	Numero	00023

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	23	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2029	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	62
Provvigione ha	960	Provvigione ha all'anno	1037
Ripresa ha anno	352	Classe di ripresa	351-375 mc
Ripresa totale all'anno	244	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.495744764416903

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	579	Altitudine minima	515
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia coetaniforme di Pino nero con Cedro e diffusione spontanea di latifoglie mesofile

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0050500019	Numero	00019

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	19	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2028	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	63
Provvigione ha	439	Provvigione ha all'anno	467
Ripresa ha anno	191	Classe di ripresa	176-200 mc
Ripresa totale all'anno	668	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	5.86303102829808

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	625	Altitudine minima	500
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	15
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	85
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Pino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento a prevalenza di cerro e roverella coniferata a tratti con pino nero. Pendenza scadente.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	12
Diametro medio	12
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	10
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0050600121	Numero	00121

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	C1	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Età prevalente	60
Provvigione ha	280	Provvigione ha all'anno	280
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	176	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.334700975245377

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	596	Altitudine minima	569
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Rilevante (tra 60 e 80 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.258260933205707

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	641	Altitudine minima	629
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Continua (oltre l'80 per cento di copertura))	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.7690951842515851

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	448	Altitudine minima	429
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Acero campestre
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Acero campestre	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco d'invasione.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.021911007866322

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	456	Altitudine minima	415
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	20
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	80
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia stadiente di Pino, con Cedro e Roverella

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.59811169175545

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	628	Altitudine minima	605
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	50
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	50
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Cedro dell'Atlante
Specie principale 3	Cipresso comune	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di latifoglie varie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0051100122	Numero	00122

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	C2	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	59
Provvigione ha	590	Provvigione ha all'anno	590
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	64	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.119410308933977

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	613	Altitudine minima	531
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	89
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	81 - 100
Composizione	Mista	Percentuale conifere	50
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	50
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Leccio
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Leccio	Specie accessoria 2	Cedro dell'Atlante
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di impianto con Pino e Leccio, quest'ultimo in migliori condizioni, tali da ritenere la specie più idonea copertura

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0051200123	Numero	00123

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	C3	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	89
Provvigione ha	780	Provvigione ha all'anno	780
Ripresa ha anno	50	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	156	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.302725471578865

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	541	Altitudine minima	469
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	89
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	81 - 100
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	Cipresso comune
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere e latifoglie, queste ultime in fase di accrescimento ed in grado di sostituire le conifere.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0051300124	Numero	00124

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	C4	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	89
Provvigione ha	780	Provvigione ha all'anno	780
Ripresa ha anno	50	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	115	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	13.110534173532377

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	525	Altitudine minima	429
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro derivante da intervento di avviamento all'alto fusto.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	23
Provvigione a ha	260
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	28
Provvigione totale	3380

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.376520813886801

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	605	Altitudine minima	584
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Assente	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	57
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia pura a densità colma.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	951-1000 mc/ha
Altezza dominante	35
Diametro medio	35
Provvigione a ha	960
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900
Altezza media	31
Area basimetrica ad ha	89
Provvigione totale	361

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0051500024	Numero	00024

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	24	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2029	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	62
Provvigione ha	960	Provvigione ha all'anno	1037
Ripresa ha anno	352	Classe di ripresa	351-375 mc
Ripresa totale all'anno	132	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.358919204618083

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	418	Altitudine minima	412
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Area intercluse fra le carreggiate

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.21126133407980702

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	428	Altitudine minima	419
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Cerro	Seconda specie in rinnovazione	Roverella
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	Latifoglie varie
Specie principale 3	Acero campestre	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinaturalizzazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A006

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	37.6586

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	6,757006762693403	006A00601
02	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	2,2743482598134857	006A00602
03	Pascoli, coltivi e altre aree aperte	0,324824305018364	006A00603
04	Cedui in evoluzione controllata	5,405664131575658	006A00604
05	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	3,979261987987766	006A00605

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia
006A008	Scopetone

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	6.757006762693403

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	546	Altitudine minima	447
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	74
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino a densità normale, con limitato inserimento di latifoglie spontanee

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.2743482598134857

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	458	Altitudine minima	444
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	50
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Acero campestre
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	Abete rosso
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Cedro dell'Atlante

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con rinnovazione densa di latifoglie tra cui orniello e acero campestre. Il pino nero si presen cedro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	351-400 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	23
Provvigione a ha	372
Incremendo medio	7.45
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	846

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0060200059	Numero	00059

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	59	N. modulo intervento	007
Tipologia intervento	Taglio raso fustaia		
Descrizione intervento	Rinaturalizzazione pinete artificiali. Sgombero del pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2035	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	RNIA		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	61
Provvigione ha	372	Provvigione ha all'anno	439
Ripresa ha anno	430	Classe di ripresa	426-450 mc
Ripresa totale all'anno	980	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.324824305018364

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	457	Altitudine minima	450
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Prati a graminacee		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0060300140	Numero	00140

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	E0	N. modulo intervento	013
Tipologia intervento	Miglioramento prato-pascolo		
Descrizione intervento	Manutenzione dei prati mediante sfalcio.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	1
Turno	1		
Etichetta	MNTP		
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	5.405664131575658

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	510	Altitudine minima	452
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	23
Uso forestale	Ceduo di robinia	Classe di età	21 - 30
Composizione	Puro	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Robinieti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Robinieto di impianto	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Robinia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco di Robinia con presenza sporadica di cerro e altre latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.979261987987766

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	549	Altitudine minima	451
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	74
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Pino insigne	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con rinnovazione affermata sottocopertura di orniello

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.691681261278165

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	501	Altitudine minima	440
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	10	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Acero campestre
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Castagno

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro con scarsa presenza di rinnovazione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.789015585701105

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	455	Altitudine minima	439
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cipresso comune
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cipresso comune	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere a densità disforme

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.252486446901682

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	449	Altitudine minima	445
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Densità
Esboscabilità	Coefficiente di copertura
Grado evolutivo	Età prevalente
Uso forestale	Classe di età
Composizione	Percentuale conifere
Categoria forestale	Percentuale latifoglie
Tipo forestale	Numero ceppaie a

MATRICINATURA

Entità	Distribuzione
Specie A	Specie B
Diffusione % specie A	Diffusione % specie
Numero ad ha matricine nel primo turno	
Numero ad ha matricine in turni maggiori del	

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	
Prima specie in rinnovazione	Seconda specie in rinnovazione
Diffusione % prima specie	Diffusione % seconda specie
Posizione prima specie	Posizione seconda specie
Distribuzione prima specie	Distribuzione seconda specie
Stato vegetativo prima	Stato vegetativo seconda
Specie principale 1	Specie accessoria 1
Specie principale 2	Specie accessoria 2
Specie principale 3	Specie accessoria 3

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Area edificata Scopetone, con unità abitative anche di proprietà privata

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	5.101795178637748

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	631	Altitudine minima	502
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Acero campestre
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Castagno

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di media-scadente fertilità per limitazioni stazionali

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.004370548008941

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	646	Altitudine minima	529
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Carpino nero
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	Castagno

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di media fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.1472739433758887

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	584	Altitudine minima	510
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	5
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	1 - 5
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Carpino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo matricinato a prevalenza di Cerro di recente utilizzazione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.693954885420203

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	630	Altitudine minima	568
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con sporadico cedro dell'Atlante a densità d'impianto.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.375384403160215

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	563	Altitudine minima	493
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Castagno
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Acero campestre

Descrizione libera	Fustaia transitoria a prevalenza di Cerro con latifoglie mesofile

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.182528450183629

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	443	Altitudine minima	437
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Roverella
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Lembo di fustaia di pino nero lungo strada. Rinnovazione affermata di latifoglie varie, tra cui orniello e roverella.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	401-450 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	23
Provvigione a ha	440
Incremendo medio	7.4
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	80

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0061400060	Numero	00060

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	60	N. modulo intervento	007
Tipologia intervento	Taglio raso fustaia		
Descrizione intervento	Rinaturalizzazione pinete artificiali. Sgombero del pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2035	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	RNIA		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	70
Provvigione ha	439	Provvigione ha all'anno	507
Ripresa ha anno	494	Classe di ripresa	476-500 mc
Ripresa totale all'anno	90	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.509086320009455

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	541	Altitudine minima	439
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	10	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Acero campestre
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Castagno

Descrizione libera	Fustaia transitoria a prevalenza di Cerro con rinnovazione sporadica di Orniello

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.178847804675816

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	536	Altitudine minima	468
Pendenza media	30 - 60 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	4
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	1 - 5
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Castagno
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Acero campestre

Descrizione libera	Ceduo matricinato a prevalenza di Cerro di recente utilizzazione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.084253327833116

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	445	Altitudine minima	443
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cipresso comune	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino nero a densità normale, con piante morte in piedi localmente presenti

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.049564731972013

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	451	Altitudine minima	443
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Area urbanizzata Scopetone. Edificio in uso ad associazioni di volontariato

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.018274080048129

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	447	Altitudine minima	446
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Area interclusa in zona stradale

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A008

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	7.091

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Pascoli, coltivi e altre aree aperte	1,226557633526769	006A00801
02	Altre superfici in evoluzione controllata	0,11166752035571301	006A00802
03	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	3,613301951527658	006A00803
04	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	0,792868069379206	006A00804
05	Altre superfici in evoluzione controllata	0,406195073281298	006A00805

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	1.226557633526769

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	559	Altitudine minima	529
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Incolto		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	nessuno		
Sistema di pascolo	nessuno		
Calcolo del carico	nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.11166752035571301

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	533	Altitudine minima	524
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.613301951527658

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	606	Altitudine minima	524
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	84
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	81 - 100
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cipresso comune	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con rinnovazione diffusa di latifoglie varie tra cui orniello e acero campestre.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	601-650 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	24
Provvigione a ha	625
Incremendo medio	7.4
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	2250

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0080300020	Numero	00020

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	20	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2028	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	88
Provvigione ha	625	Provvigione ha all'anno	653
Ripresa ha anno	267	Classe di ripresa	251-275 mc
Ripresa totale all'anno	965	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.792868069379206

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	600	Altitudine minima	560
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Douglasia di scadente fertilità a densità disforme per schianti e morie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.406195073281298

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	583	Altitudine minima	558
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Leccio	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.8896412894803679

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	612	Altitudine minima	575
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	50
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	50
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cipresso comune
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cipresso comune	Specie accessoria 2	Orniello
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	Cedro dell'Atlante

Descrizione libera	Fustaia mista di impianto a densità disforme per ampie zone lacunose e locali morie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A009

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	17.707

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Boschi in evoluzione naturale	0,757594654684956	006A00901
02	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	0,9299231130871111	006A00902
03	Fustaie miste in evoluzione controllata	0,46854815481123496	006A00903
04	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	2,582157350674039	006A00904
05	Boschi in evoluzione naturale	0,714212491123585	006A00905

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Zona di Protezione Speciale (ZPS)

Superficie totale ha	0.757594654684956

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	855	Altitudine minima	806
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	Ciliegio
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Castagneto abbandonate

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.9299231130871111

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	890	Altitudine minima	860
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Douglasia a densità disforme

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0090200081	Numero	00081

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	81	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	60
Provvigione ha	750	Provvigione ha all'anno	750
Ripresa ha anno	50	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	46	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.46854815481123496

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	900	Altitudine minima	887
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	61
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	40
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	60
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Acero montano
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Abete bianco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Acero montano	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Pino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di conifere e latifoglie mista con abete bianco, acero di monte, pino nero e cerro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dato piano precedente
Classe di provvigione	651-700 mc/ha
Altezza dominante	29
Diametro medio	30
Provvigione a ha	698
Incremendo medio	11.4
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900 piante/ha
Altezza media	23
Area basimetrica ad ha	59
Provvigione totale	87

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0090300082	Numero	00082

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	82	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	61
Provvigione ha	700	Provvigione ha all'anno	700
Ripresa ha anno	50	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	23	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.582157350674039

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	880	Altitudine minima	833
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di specie non spontanee di minore pregio	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianto di abete greco	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Abete bianco
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Abete greco	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Abete bianco	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Pino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia a prevalenza di abete greco con sviluppo e densità regolari. Oltre all'abete greco sono presenti piccoli nu nero.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	25
Diametro medio	22
Provvigione a ha	250
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	40
Provvigione totale	695

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0090400083	Numero	00083

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	83	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Età prevalente	59
Provvigione ha	780	Provvigione ha all'anno	780
Ripresa ha anno	50	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	129	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.714212491123585

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	897	Altitudine minima	878
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Castagno derivante da invecchiamento di castagneti da frutto

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.368070274023747

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	879	Altitudine minima	754
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	Carpino nero
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Ciliegio

Descrizione libera	Fustaia mista a struttura disetaneiforme derivante da abbandono di castagneti da frutto

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.629641924755741

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	910	Altitudine minima	873
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Abete bianco
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Abete bianco	Specie accessoria 2	Douglasia
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia a prevalenza di pino nero con abete bianco e acero di monte.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0090700084	Numero	00084

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	84	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	60
Provvigione ha	660	Provvigione ha all'anno	660
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	49	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.515086041486124

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	872	Altitudine minima	857
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Acero montano
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Acero montano	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero a densità colma con acero di monte.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	351-400 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	23
Provvigione a ha	384
Incremendo medio	7.4
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	45
Provvigione totale	747

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0090800025	Numero	00025

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	25	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	66
Provvigione ha	747	Provvigione ha all'anno	814
Ripresa ha anno	215	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	111	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.7349676143762687

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	911	Altitudine minima	889
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino nero con Douglasia diradata in epoca recente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0090900085	Numero	00085

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	85	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	60
Provvigione ha	660	Provvigione ha all'anno	660
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	82	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.290130600863323

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	906	Altitudine minima	899
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	61
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Acero montano	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro a densità disforme

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0091000086	Numero	00086

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	86	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Età prevalente	61
Provvigione ha	500	Provvigione ha all'anno	500
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	9	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.353111669884536

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	814	Altitudine minima	764
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di Castagno e Cerro distribuiti per nuclei

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.363561409349962

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	894	Altitudine minima	871
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	61
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	30
Categoria forestale	Impianti di specie non spontanee di minore pregio	Percentuale latifoglie	70
Tipo forestale	Altri impianti artificiali	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Latifoglie varie
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Acero montano	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Latifoglie varie	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di latifoglie con piante di acero di monte. L'abete bianco è pericolo scomparso e rimangono residuali piante.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0091200087	Numero	00087

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	87	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Età prevalente	61
Provvigione ha	500	Provvigione ha all'anno	500
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	41	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 006A010

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	54.7102

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	3,752187046994618	006A01001
02	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	4,9957941652893325	006A01002
03	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	3,52131658653575	006A01003
04	Boschi in evoluzione naturale	1,5599610724463249	006A01004
05	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	0,530120036361518	006A01005

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia
006A009	Scopeto Alto

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Zona di Protezione Speciale (ZPS)

Superficie totale ha	3.752187046994618

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	898	Altitudine minima	749
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro, di scadente fertilità, con ampie zone lacunose

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0100100088	Numero	00088

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	88	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	69
Provvigione ha	320	Provvigione ha all'anno	320
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	112	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	4.9957941652893325

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	834	Altitudine minima	711
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di latifoglie con castagno e cerro prevalenti, in passato castagneto da frutto

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0100200089	Numero	00089

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	89	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di castagno	Età prevalente	999
Provvigione ha	300	Provvigione ha all'anno	300
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	150	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.52131658653575

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	918	Altitudine minima	843
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro di media fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.5599610724463249

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	930	Altitudine minima	919
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	20
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Bosco temporaneamente privo di soprassuolo	Classe di età	51 -
Composizione	Misto	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Acero montano
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Acero montano	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Area aperta schiantata con residuali piante di pino nero e piccoli nuclei di acero di monte.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.530120036361518

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	888	Altitudine minima	856
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 -
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Abete bianco	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia rada di Douglasia a cui si associa il Cerro con piante di buone dimensioni

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.1564251804210248

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	831	Altitudine minima	782
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	53
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	Orniello
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere con Cerro diffuso e altre latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.436098488686397

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	936	Altitudine minima	929
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Assente	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia di fertilità da media a scadente.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	801-850 mc/ha
Altezza dominante	32
Diametro medio	35
Provvigione a ha	810
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50
Altezza media	28
Area basimetrica ad ha	70
Provvigione totale	353

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0100700001	Numero	00001

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	01	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	59
Provvigione ha	990	Provvigione ha all'anno	990
Ripresa ha anno	334	Classe di ripresa	326-350 mc
Ripresa totale all'anno	145	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.855519911828125

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	936	Altitudine minima	883
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	62
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino nero con nuclei di Douglasia e latifoglie, ferolita scadente, con zone lacunose

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0100800090	Numero	00090

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	90	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	62
Provvigione ha	680	Provvigione ha all'anno	680
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	74	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.8943927158941749

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	848	Altitudine minima	783
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	53
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Douglasia
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento a prevalenza di Cerro con latifoglie e piccoli nuclei di conifere

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.3111936473969739

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	739	Altitudine minima	683
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro di scadente fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.944292336107837

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	895	Altitudine minima	831
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 -
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro con ampie zone denudate

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.124966996654013

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	923	Altitudine minima	854
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	50
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	50
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Douglasia	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista conifere latifoglie con Pino nero e Cerro prevalente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	1

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0101200091	Numero	00091

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	91	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	69
Provvigione ha	690	Provvigione ha all'anno	690
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	45	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.789590235434633

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	830	Altitudine minima	709
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia a prevalenza di Cerro con roverella soggetta a diradamento in epoca recente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0101300092	Numero	00092

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	92	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Età prevalente	69
Provvigione ha	320	Provvigione ha all'anno	320
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	84	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.511942172488454

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	813	Altitudine minima	792
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	62
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	Orniello
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino nero a densità disforme con associate latifoglie di origine spontanea

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	751-800 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	22
Provvigione a ha	772
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	395

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0101400026	Numero	00026

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	26	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	68
Provvigione ha	772	Provvigione ha all'anno	840
Ripresa ha anno	221	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	113	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.092037454385584

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	883	Altitudine minima	759
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista disetaneiforme di latifoglie varie, con ampie zone a Cerro derivante da abbandono di castagneto d frutto

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0101500093	Numero	00093

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	93	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di castagno	Età prevalente	999
Provvigione ha	300	Provvigione ha all'anno	300
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	30	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	6.224187628340314

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	860	Altitudine minima	736
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Castagno
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro diradata di recente con zone lacunose

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	9.06753416658152

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	930	Altitudine minima	772
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	62
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Acero montano
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	Abete bianco
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Orniello

Descrizione libera	Fustaia di pino nero di fertilità discreta con rinnovazione localmente affermata di orniello, cerro, acero di monte, carbonai.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	651-700 mc/ha
Altezza dominante	29
Diametro medio	27
Provvigione a ha	671
Incremendo medio	10.8
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	21
Area basimetrica ad ha	76
Provvigione totale	6084

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0101700002	Numero	00002

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	02	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	62
Provvigione ha	671	Provvigione ha all'anno	671
Ripresa ha anno	208	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	1886	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.456349671583821

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	807	Altitudine minima	708
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro con Roverella, Orniello di scadente fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.454221673772403

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	841	Altitudine minima	829
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	62
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia di discreto sviluppo con rinnovazione affermata di cerro, orniello e latifoglie varie.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	901-950 mc/ha
Altezza dominante	35
Diametro medio	35
Provvigione a ha	940
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50
Altezza media	31
Area basimetrica ad ha	80
Provvigione totale	426

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0101900027	Numero	00027

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	27	N. modulo intervento	007
Tipologia intervento	Taglio raso fustaia		
Descrizione intervento	Rinaturalizzazione impianti artificiali. Sgombero della douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	RNIA		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	68
Provvigione ha	1100	Provvigione ha all'anno	1197
Ripresa ha anno	1145	Classe di ripresa	801-850 mc
Ripresa totale all'anno	520	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.2187042610151

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	958	Altitudine minima	915
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	62
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	50
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	50
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Acero montano
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Acero montano	Specie accessoria 2	Douglasia
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di Pino con Ontano, Cerro, Acero montano e Douglasia. Residuali piante di Abete bianco

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.770833332520748

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	930	Altitudine minima	869
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Assente	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	95
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	5
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Acero montano	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia a densità colma di media fertilità con sporadico pino nero e acero di monte.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	951-1000 mc/ha
Altezza dominante	35
Diametro medio	35
Provvigione a ha	950
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900
Altezza media	31
Area basimetrica ad ha	80
Provvigione totale	732

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0102100003	Numero	00003

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	03	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	59
Provvigione ha	990	Provvigione ha all'anno	990
Ripresa ha anno	334	Classe di ripresa	326-350 mc
Ripresa totale all'anno	257	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.226229216769105

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	729	Altitudine minima	648
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 -
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro, in area a roccia affiorante

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.542875198063126

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	959	Altitudine minima	883
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro con castagno e carpino nero, quest'ultimo presente principalmente negli impluvi. Den denso.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0102300037	Numero	00037

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	37	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2031	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	76
Provvigione ha	274	Provvigione ha all'anno	299
Ripresa ha anno	69	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	176	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.27344415954398

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	816	Altitudine minima	800
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	62
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Residuali piante di pino nero.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A011

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	35.8006

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	4,310504777088338	006A01101
02	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	2,758866494408762	006A01102
03	Altre superfici in evoluzione controllata	3,999073570909866	006A01103
04	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,42611957981139403	006A01104
05	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	8,186349993194508	006A01105

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
006A001	sorgente

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
006A003	laghetto antincendio
006A013	area di sosta attrezzata
006A014	area di sosta attrezzata

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	4.310504777088338

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	901	Altitudine minima	858
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia pura di pino nero a densità colma con impianto eseguito su ex terreno gradonato.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	651-700 mc/ha
Altezza dominante	28
Diametro medio	31
Provvigione a ha	688
Incremendo medio	11.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	23
Area basimetrica ad ha	75
Provvigione totale	2965

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0110100005	Numero	00005

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	05	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	60
Provvigione ha	688	Provvigione ha all'anno	699
Ripresa ha anno	196	Classe di ripresa	176-200 mc
Ripresa totale all'anno	846	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.758866494408762

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	897	Altitudine minima	837
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Abete bianco	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia a densità colma a prevalenza di douglasia con pino nero e abete bianco.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	901-950 mc/ha
Altezza dominante	35
Diametro medio	35
Provvigione a ha	910
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	31
Area basimetrica ad ha	85
Provvigione totale	387

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0110200006	Numero	00006

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	06	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2025	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	60
Provvigione ha	990	Provvigione ha all'anno	1006
Ripresa ha anno	340	Classe di ripresa	326-350 mc
Ripresa totale all'anno	938	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.999073570909866

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	881	Altitudine minima	806
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.42611957981139403

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	880	Altitudine minima	834
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	51
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia di buon sviluppo e portamento a densità colma.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	901-950 mc/ha
Altezza dominante	35
Diametro medio	35
Provvigione a ha	387
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	31
Area basimetrica ad ha	80
Provvigione totale	910

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0110400007	Numero	00007

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	07	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	53
Provvigione ha	820	Provvigione ha all'anno	855
Ripresa ha anno	287	Classe di ripresa	276-300 mc
Ripresa totale all'anno	123	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	8.186349993194508

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	923	Altitudine minima	808
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	51
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con conifere varie, a densità disforme a tratti rada con ampie chiarie e zone lacunose.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	351-400 mc/ha
Altezza dominante	22
Diametro medio	25
Provvigione a ha	370
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	18
Area basimetrica ad ha	50
Provvigione totale	2800

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0110500094	Numero	00094

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	94	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	51
Provvigione ha	560	Provvigione ha all'anno	560
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	327	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.17851540132098

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	860	Altitudine minima	772
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	48
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	41 - 50
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di conifere varie con Douglasia distribuita pi gruppi cui si associano il Pino nero e latifoglie vare

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0110600095	Numero	00095

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	95	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Età prevalente	48
Provvigione ha	650	Provvigione ha all'anno	650
Ripresa ha anno	50	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	159	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.576079190457426

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	868	Altitudine minima	761
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro a densità scarsa e fertilità scadente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0110700096	Numero	00096

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	96	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	69
Provvigione ha	320	Provvigione ha all'anno	320
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	107	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.6350260802228

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	810	Altitudine minima	735
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia disetaneiforme a prevalenza di Castagno con latifoglie varie e piccoli nuclei di conifere. Densità disforme Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.12496086025117

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	811	Altitudine minima	732
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	3
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	1 - 5
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	elevata	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo giovane con zone rilasciate al taglio

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.53562558422368

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	963	Altitudine minima	947
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.089059042988159

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Sociale e culturale
Compresa	Boschi con funzione turistico-ricreativa

Altitudine massima	901	Altitudine minima	900
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino adibita ad uso turistico-ricreativo

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0111100145	Numero	00145

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	E5	N. modulo intervento	008
Tipologia intervento	Manutenzione aree e punti di sosta		
Descrizione intervento	Taglio degli alberi pericolanti con sfalcio dell'erba e decespugliamento.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	1
Turno	1		
Etichetta	MGLT		
Compresa	Boschi con funzione turistico-ricreativa		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	59
Provvigione ha	650	Provvigione ha all'anno	650
Ripresa ha anno	1	Classe di ripresa	0- 25 mc
Ripresa totale all'anno	1	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.19577736198287501

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Sociale e culturale
Compresa	Boschi con funzione turistico-ricreativa

Altitudine massima	898	Altitudine minima	891
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino adibita ad uso turistico-ricreativo

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0111200075	Numero	00075

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	75	N. modulo intervento	008
Tipologia intervento	Manutenzione aree e punti di sosta		
Descrizione intervento	Taglio degli alberi pericolanti con sfalcio dell'erba e decespugliamento.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	1
Turno	1		
Etichetta	MGLT		
Compresa	Boschi con funzione turistico-ricreativa		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	59
Provvigione ha	650	Provvigione ha all'anno	650
Ripresa ha anno	1	Classe di ripresa	0- 25 mc
Ripresa totale all'anno	1	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.46031692188233103

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	778	Altitudine minima	750
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	20
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	80
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Pino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.11853837249390799

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	734	Altitudine minima	724
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Tratto di strada

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.215533697110415

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	842	Altitudine minima	836
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Lagheto AIB con relativa area di rispetto

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.642638865595392

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	869	Altitudine minima	825
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro di media fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0111600097	Numero	00097

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	97	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	69
Provvigione ha	320	Provvigione ha all'anno	320
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	19	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.0464803487756993

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	809	Altitudine minima	745
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Latifoglie varie
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro, in prossima del limite Sud è presente una fascia tagliata a ceduo

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.2145740876827391

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	804	Altitudine minima	776
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro di media fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0111800098	Numero	00098

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	98	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	69
Provvigione ha	320	Provvigione ha all'anno	320
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	30	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.213519959923252

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	770	Altitudine minima	750
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.873041062969703

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	855	Altitudine minima	840
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	47
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	41 - 50
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Douglasia diradata di recente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0112000099	Numero	00099

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	99	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	47
Provvigione ha	650	Provvigione ha all'anno	650
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	35	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 006A012

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	27.2332

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	2,2501464365369412	006A01201
02	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	5,409431385682129	006A01202
03	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	0,608500232329825	006A01203
04	Altre superfici in evoluzione controllata	0,374258583730133	006A01204
05	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,862616048085503	006A01205

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	2.2501464365369412

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	900	Altitudine minima	851
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con sporadiche latifoglie d'impianto. Sotto copertura è presente uno strato denso di rinnova varie.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	701-750 mc/ha
Altezza dominante	29
Diametro medio	25
Provvigione a ha	735
Incremendo medio	12.4
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1500 - 2000
Altezza media	21
Area basimetrica ad ha	83
Provvigione totale	1635

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0120100028	Numero	00028

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	28	N. modulo intervento	007
Tipologia intervento	Taglio raso fustaia		
Descrizione intervento	Rinaturalizzazione pinete artificiali. Sgombero del pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	RNIA		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	65
Provvigione ha	735	Provvigione ha all'anno	802
Ripresa ha anno	769	Classe di ripresa	751-800 mc
Ripresa totale all'anno	1730	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	5.409431385682129

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	892	Altitudine minima	811
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	71
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	15
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	85
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Pino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria a prevalenza di Cerro, coniferata per gruppi

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0120200100	Numero	00100

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	A0	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	71
Provvigione ha	330	Provvigione ha all'anno	330
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	162	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.608500232329825

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	871	Altitudine minima	822
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	71
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di specie quercine con Castagno, quest'ultimo in pessimo stato fitosanitario

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.374258583730133

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	921	Altitudine minima	906
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.862616048085503

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	806	Altitudine minima	782
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Assente	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia di ottima fertilità a densità colma

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	851-900 mc/ha
Altezza dominante	35
Diametro medio	35
Provvigione a ha	735
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1500 - 2000
Altezza media	31
Area basimetrica ad ha	85
Provvigione totale	392

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0120500008	Numero	00008

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	08	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	61
Provvigione ha	990	Provvigione ha all'anno	1022
Ripresa ha anno	345	Classe di ripresa	326-350 mc
Ripresa totale all'anno	298	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.525458158535278

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	798	Altitudine minima	737
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia disetaneiforme derivante da abbandono di castagneto da frutto, castagno diffuso anche per gradi pollo Cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0120600101	Numero	00101

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	A1	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di castagno	Età prevalente	999
Provvigione ha	300	Provvigione ha all'anno	300
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	46	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.23075065085119

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	940	Altitudine minima	905
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 -
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	Latifoglie varie
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con cedro dell'Atlante di fertilità scarsa a densità rada con ampie zone rocciose dove si sono arbustive.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.3222299676850948

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	914	Altitudine minima	886
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.502754498228705

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	817	Altitudine minima	732
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	71
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria a prevalenza di Cerro, con sporadiche piante da frutto di Castagno. Fertilità da media a buona

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0120900102	Numero	00102

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	A2	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	71
Provvigione ha	330	Provvigione ha all'anno	330
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	105	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.534307815550384

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	878	Altitudine minima	871
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con sporadiche latifoglie d'impianto. Sotto copertura è presente uno strato denso di rinnova varie.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	701-750 mc/ha
Altezza dominante	29
Diametro medio	24
Provvigione a ha	735
Incremendo medio	12.4
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1500 - 2000
Altezza media	21
Area basimetrica ad ha	83
Provvigione totale	392

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0121000009	Numero	00009

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	09	N. modulo intervento	007
Tipologia intervento	Taglio raso fustaia		
Descrizione intervento	Rinaturalizzazione pinete artificiali. Sgombero del pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	RNIA		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	61
Provvigione ha	735	Provvigione ha all'anno	759
Ripresa ha anno	721	Classe di ripresa	701-750 mc
Ripresa totale all'anno	385	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.947261314135835

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	902	Altitudine minima	888
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con locale rinnovazione di latifoglie, prevalentemente orniello, anche affermata.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	651-700 mc/ha
Altezza dominante	29
Diametro medio	25
Provvigione a ha	688
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1500 - 2000
Altezza media	21
Area basimetrica ad ha	83
Provvigione totale	1339

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0121100010	Numero	00010

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	10	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	61
Provvigione ha	688	Provvigione ha all'anno	710
Ripresa ha anno	200	Classe di ripresa	176-200 mc
Ripresa totale all'anno	388	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.329154181802285

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	836	Altitudine minima	768
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	71
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro di buona fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0121200103	Numero	00103

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	A3	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	71
Provvigione ha	330	Provvigione ha all'anno	330
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	100	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.7294042931371842

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	849	Altitudine minima	757
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia disetaneiforme mista con Castagno, Cerro e altre latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.361026715144754

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	934	Altitudine minima	925
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.094305196162686

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	940	Altitudine minima	939
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.583996755265875

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	966	Altitudine minima	941
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.567640485810139

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	960	Altitudine minima	940
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 - 50
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	Latifoglie varie
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia a prevalenza di pino nero con conifere varie di fertilità mediocre.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	601-650 mc/ha
Altezza dominante	150
Diametro medio	21
Provvigione a ha	610
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	29
Area basimetrica ad ha	27
Provvigione totale	346

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0121700011	Numero	00011

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	11	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	51
Provvigione ha	610	Provvigione ha all'anno	634
Ripresa ha anno	166	Classe di ripresa	151-175 mc
Ripresa totale all'anno	94	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 006A013

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	34.3613

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	0,701408968250267	006A01301
02	Altre superfici in evoluzione controllata	1,800642708345117	006A01302
03	Boschi con funzione turistico-ricreativa	3,238660404025577	006A01303
04	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	2,441104863488805	006A01304
05	Boschi in evoluzione naturale	0,597684114502627	006A01305

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia
006A010	Casa Siole

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Zona di Protezione Speciale (ZPS)

Superficie totale ha	0.701408968250267

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	990	Altitudine minima	949
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Assente	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	41 - 50
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia pura mai diradata a sesto d'impianto originario.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.800642708345117

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	878	Altitudine minima	815
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinaturalizzazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.238660404025577

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Sociale e culturale
Compresa	Boschi con funzione turistico-ricreativa

Altitudine massima	870	Altitudine minima	803
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	70
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	30
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Abete bianco
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie del piano dominante		
Prima specie in rinnovazione	Abete bianco	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Abete bianco	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Douglasia	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco irregolare misto a gruppo su ex-castagneto da frutto con pino nero, abete bianco, douglasia. Presenza di gruppi.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0130300076	Numero	00076

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	76	N. modulo intervento	008
Tipologia intervento	Manutenzione aree e punti di sosta		
Descrizione intervento	Taglio degli alberi pericolanti con sfalcio dell'erba e decespugliamento.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	1
Turno	1		
Etichetta	MGLT		
Compresa	Boschi con funzione turistico-ricreativa		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	999
Provvigione ha	760	Provvigione ha all'anno	760
Ripresa ha anno	1	Classe di ripresa	0- 25 mc
Ripresa totale all'anno	1	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.441104863488805

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	881	Altitudine minima	819
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	41 - 50
Composizione	Mista	Percentuale conifere	80
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	20
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Acero campestre
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia adulta mista di conifere con latifoglie spontanee, nella parte a sud nucleo affermato di latifoglie miste

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.597684114502627

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	819	Altitudine minima	788
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro di media fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	6.611319176537416

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	980	Altitudine minima	816
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	40
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	60
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Abete bianco	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere e latifoglie, con cerro e conifere varie tra cui pino nero, cedro dell'Atlante, abete bianco douglasia.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0130600105	Numero	00105

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	A5	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	69
Provvigione ha	690	Provvigione ha all'anno	690
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	265	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.7356462407281972

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	970	Altitudine minima	907
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	45
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	41 -
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Abete bianco
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Abete bianco	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere varie con abete bianco e pino nero. Entrambe le specie si trovano in scadenti condizion piedi.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	14
Diametro medio	15
Provvigione a ha	218
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	12
Area basimetrica ad ha	35
Provvigione totale	778

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0130700106	Numero	00106

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	A6	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Età prevalente	45
Provvigione ha	600	Provvigione ha all'anno	600
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	70	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.209883630848338

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	927	Altitudine minima	845
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di conifere a prevalenza di Pino nero con Douglasia

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0130800107	Numero	00107

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	A7	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	59
Provvigione ha	650	Provvigione ha all'anno	650
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	88	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.203303336339444

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	970	Altitudine minima	963
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Acero campestre	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinaturalizzazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.457284824600257

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	975	Altitudine minima	944
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	bassa	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.052170542951301004

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	1046	Altitudine minima	1038
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinaturalizzazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.134923260070756

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	1073	Altitudine minima	982
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	41 - 50
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Douglasia	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere impiantata per gruppi con pino nero, cedro dell'Atlante e douglasia, mai diradata, con s fertilità.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	601-650 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	21
Provvigione a ha	650
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	13
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	1950

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.48149375688433704

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	930	Altitudine minima	870
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Cerro di media fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.447105429163412

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	859	Altitudine minima	823
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.864440283150319

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	970	Altitudine minima	961
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Carpino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.728158916963404

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	840	Altitudine minima	787
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Assente	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	31 - 40
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia su ex castagneto da frutto a copertura densa con presenza di locali piante affermate di cerro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	751-800 mc/ha
Altezza dominante	35
Diametro medio	35
Provvigione a ha	800
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	31
Area basimetrica ad ha	89
Provvigione totale	1382

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0131600012	Numero	00012

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	12	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	42
Provvigione ha	698	Provvigione ha all'anno	731
Ripresa ha anno	247	Classe di ripresa	226-250 mc
Ripresa totale all'anno	427	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.787347016780474

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	892	Altitudine minima	816
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	80
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	20
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Abete bianco
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie del piano dominante		
Prima specie in rinnovazione	Abete bianco	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Abete bianco	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere con latifoglie di invasione e porzioni a copertura arbustiva densa

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.914394742949001

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	959	Altitudine minima	904
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	47
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	41 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Abete bianco	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di conifere varie a prevalenza di douglasia a densità rada.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	551-600 mc/ha
Altezza dominante	29
Diametro medio	27
Provvigione a ha	585
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	21
Area basimetrica ad ha	75
Provvigione totale	1120

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0131800013	Numero	00013

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	13	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Età prevalente	49
Provvigione ha	585	Provvigione ha all'anno	608
Ripresa ha anno	159	Classe di ripresa	151-175 mc
Ripresa totale all'anno	305	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.6710153462347868

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	926	Altitudine minima	838
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Douglasia a densità colma, poca presenza di latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0131900014	Numero	00014

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	14	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2026	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	61
Provvigione ha	990	Provvigione ha all'anno	1022
Ripresa ha anno	345	Classe di ripresa	326-350 mc
Ripresa totale all'anno	923	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.23480235163647498

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	991	Altitudine minima	977
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 - 50
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Conifere varie
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Conifere varie	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino a densità colma, sporadiche latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.394940125273168

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	1036	Altitudine minima	1004
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	41 - 50
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Abete bianco	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di conifere varie varie con latifoglie di invasione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.7070572142003101

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	1071	Altitudine minima	976
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	41 - 50
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro con sporadiche conifere

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A014

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	19.9972

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	2,634559130233573	006A01401
02	Boschi in evoluzione naturale	3,8531404775520532	006A01402
03	Altre superfici in evoluzione controllata	0,554095444421843	006A01403
04	Altre superfici in evoluzione controllata	0,464617195192911	006A01404
05	Altre superfici in evoluzione controllata	1,878525553852925	006A01405

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	2.634559130233573

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	742	Altitudine minima	658
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	57
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	80
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	20
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	Latifoglie varie
Specie principale 3	Abete bianco	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia recentemente diradata con pino nero, abete bianco e sporadico pino silvestre. Diffusa prese latifoglie.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.8531404775520532

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	701	Altitudine minima	637
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	61
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	20
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	80
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Pino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro e latifoglie a densità disforme

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.554095444421843

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	817	Altitudine minima	792
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.464617195192911

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	668	Altitudine minima	657
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinaturalizzazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.878525553852925

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	707	Altitudine minima	660
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.837491571076773

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	743	Altitudine minima	632
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie limitrofe		
Prima specie in rinnovazione	Douglasia	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex castagneto da frutto. Il castagno, costituito sia da polloni che da piante franche, è in pessime condizioni vegeta douglasia.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.727264722298738

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	818	Altitudine minima	752
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria a prevalenza di Cerro con Roverella di media fertilità a densità disforme per chiarie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0140700108	Numero	00108

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	A8	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	69
Provvigione ha	320	Provvigione ha all'anno	320
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	52	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.429592215082375

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	813	Altitudine minima	798
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro di scadente fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0140800109	Numero	00109

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	A9	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	69
Provvigione ha	320	Provvigione ha all'anno	320
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	13	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.6187010296525899

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	680	Altitudine minima	636
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia a prevalenza di Cerro con residuali piante di conifere

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.999214094697428

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	766	Altitudine minima	636
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria a prevalenza di Cerro a fertilità scadente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A015

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	9.4477

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Boschi in evoluzione naturale	3,403329042380245	006A01501
02	Boschi in evoluzione naturale	2,660081050309912	006A01502
03	Pascoli, coltivi e altre aree aperte	0,151837523876037	006A01503
04	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	1,523478709407817	006A01504
05	Pascoli, coltivi e altre aree aperte	0,109435844971213	006A01505

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Zona di Protezione Speciale (ZPS)

Superficie totale ha	3.403329042380245

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	661	Altitudine minima	560
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	41 - 50
Composizione	Mista	Percentuale conifere	40
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	60
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Pino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Soprassuolo a densità disforme per struttura e composizione, con latifoglie prevalenti

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.660081050309912

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	625	Altitudine minima	521
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	68
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di latifoglie varie con Cerro e Roverella prevalenti, di scadente fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.151837523876037

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	650	Altitudine minima	645
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Praterie a graminacee		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0150300141	Numero	00141

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	E1	N. modulo intervento	013
Tipologia intervento	Miglioramento prato-pascolo		
Descrizione intervento	Manutenzione dei prati mediante sfalcio.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	1
Turno	1		
Etichetta	MNTP		
Compresa	Pascoli e coltivi		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.523478709407817

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	806	Altitudine minima	777
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	56
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con douglasia, di buon sviluppo e portamento.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.109435844971213

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	660	Altitudine minima	657
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	difficile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Prateria a graminacee		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0150500142	Numero	00142

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	E2	N. modulo intervento	013
Tipologia intervento	Miglioramento prato-pascolo		
Descrizione intervento	Manutenzione dei prati mediante sfalcio.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	1
Turno	1		
Etichetta	MNTP		
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.415227216094174

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	705	Altitudine minima	670
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	68
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco su zona impervia e non accessibile

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.43883958425112096

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	825	Altitudine minima	810
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinaturalizzazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.745468292683997

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	537	Altitudine minima	506
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	68
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di latifoglie a struttura irregolare

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A016

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	19.8737

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	2,8701251321379098	006A01601
02	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	2,017932433662005	006A01602
03	Boschi in evoluzione naturale	2,283995721847799	006A01603
04	Boschi in evoluzione naturale	1,89090827330621	006A01604
05	Cedui in evoluzione controllata	1,033751575676303	006A01605

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Zona di Protezione Speciale (ZPS)

Superficie totale ha	2.8701251321379098

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	824	Altitudine minima	695
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	51
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di castagno	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Carpino bianco	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento da ceduo di Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.017932433662005

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	877	Altitudine minima	789
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	51
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Carpino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di latifoglie varie a struttura irregolare con presenza di Castagno dependente e Carpino nero

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.283995721847799

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	678	Altitudine minima	570
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	61
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro con Roverella

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.89090827330621

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	674	Altitudine minima	537
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di castagno	Classe di età	51 -
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia derivante da invecchiamento di ceduo a prevalenza di Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.033751575676303

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	719	Altitudine minima	679
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	28
Uso forestale	Ceduo di castagno	Classe di età	21 - 30
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo di Castagno con latifoglie, in mediocre stato vegetativo

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.596126677179634

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	679	Altitudine minima	537
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Ceduo invecchiato di castagno >50	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Carpino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo invecchiato di castagno di scadente stato fitosanitario in fase di sostituzione dalle altre latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.334140975552849

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	813	Altitudine minima	780
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Ceduo invecchiato di castagno >50	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo invecchiato di castagno in mediocri condizioni fitosanitarie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.313570453130056

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	672	Altitudine minima	521
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di castagno	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia derivante da invecchiamento di ceduo a prevalenza di Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.162306402269006

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	724	Altitudine minima	680
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di castagno	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Carpino bianco	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia derivante da invecchiamento di ceduo a prevalenza di Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.404858068176732

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	722	Altitudine minima	581
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di castagno	Classe di età	51 -
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia derivante da invecchiamento di ceduo a prevalenza di Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.749721815893636

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	702	Altitudine minima	590
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Ceduo invecchiato di castagno >50	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Carpino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo invecchiato di castagno di scadente stato fitosanitario in fase di sostituzione dalle altre latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.233026749644376

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	778	Altitudine minima	737
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	16
Uso forestale	Ceduo di castagno	Classe di età	11 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime a prevalenza di Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A017

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	25.5804

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Cedui in gestione ordinaria	7,310776726153622	006A01701
02	Cedui in gestione ordinaria	0,580977792041627	006A01702
03	Cedui in gestione ordinaria	2,577201933157561	006A01703
04	Cedui in gestione ordinaria	4,023893790268005	006A01704
05	Boschi in evoluzione naturale	1,353029391451465	006A01705

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Superficie totale ha	7.310776726153622

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	540	Altitudine minima	436
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	10
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	6 - 10
Composizione	Puro	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime di Cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.580977792041627

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	551	Altitudine minima	515
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	5
Uso forestale	Ceduo di castagno	Classe di età	1 - 5
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo tagliato solo parzialmente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.577201933157561

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	595	Altitudine minima	447
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	9
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	6 - 10
Composizione	Puro	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime di Cerro con Roverella

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.023893790268005

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	703	Altitudine minima	579
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	22
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	21 - 30
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	elevata	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime a prevalenza di Cerro con polloni caratterizzati da scarso sviluppop

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.353029391451465

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	603	Altitudine minima	549
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	bosco a struttura irregolare che caratterizza l'area di influenza del corso d'acqua

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.0693966273308269

Legge 39	Castagneto da frutto
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	582	Altitudine minima	532
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Castagneto da frutto	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Puro	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Castagneto da frutto in coltivazione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	6.464471549335216

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	698	Altitudine minima	550
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	64
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di cerro e carpino nero con ceppaia di castagno, carpino bianco, orniello e matricine v altezza.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.479214743015729

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	617	Altitudine minima	578
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	64
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco irregolare per struttura mista e disforme invecchiata

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.496695478572897

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	566	Altitudine minima	493
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	64
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di cerro e carpino nero con ceppaia di castagno, carpino bianco, orniello e matricine v altezza.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.22474646311066998

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	620	Altitudine minima	620
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	15
Uso forestale	Ceduo di castagno	Classe di età	11 - 20
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime di Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A018

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	31.5702

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	1,268435164361005	006A01801
02	Fustaie miste in gestione ordinaria	5,098145777113806	006A01802
03	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	2,395332296690298	006A01803
04	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	2,171634653546556	006A01804
05	Altre superfici	0,048971568113286006	006A01805

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia
006A011	Le Chiusure-La Villa

ISTITUZIONI

Superficie totale ha	1.268435164361005

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	693	Altitudine minima	663
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con douglasia.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	701-750 mc/ha
Altezza dominante	29
Diametro medio	27
Provvigione a ha	740
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	21
Area basimetrica ad ha	76
Provvigione totale	938

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0180100041	Numero	00041

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	41	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2032	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	62
Provvigione ha	740	Provvigione ha all'anno	835
Ripresa ha anno	206	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	262	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	5.098145777113806

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie miste in gestione

Altitudine massima	704	Altitudine minima	588
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Douglasia	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere e latifoglie con pino nero e douglasia e latifoglie d'impianto.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	651-700 mc/ha
Altezza dominante	26
Diametro medio	24
Provvigione a ha	680
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	48
Provvigione totale	3466

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0180200042	Numero	00042

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	42	N. modulo intervento	005
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie miste di conifere e latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2032	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDM		
Compresa	Fustaie miste in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	62
Provvigione ha	680	Provvigione ha all'anno	767
Ripresa ha anno	183	Classe di ripresa	176-200 mc
Ripresa totale all'anno	936	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.395332296690298

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	596	Altitudine minima	517
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro con locali nuclei di Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0180300046	Numero	00046

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	46	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2033	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Età prevalente	78
Provvigione ha	274	Provvigione ha all'anno	305
Ripresa ha anno	71	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	170	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.171634653546556

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	680	Altitudine minima	676
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	66
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro a densità regolare.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0180400047	Numero	00047

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	47	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2033	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	75
Provvigione ha	262	Provvigione ha all'anno	293
Ripresa ha anno	68	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	148	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.048971568113286006

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	689	Altitudine minima	682
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Area edificata denominata Le Chiusure - La Villa. Non utilizzata

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.016408696885966

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	603	Altitudine minima	566
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Acero campestre	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinaturalizzazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.7035608536559332

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	582	Altitudine minima	483
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	61 -
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia rada di Cerro e altre latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.767510458777783

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	701	Altitudine minima	583
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	15
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	11 - 20
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo degradato recentemente tagliato. Accrescimenti ridotti sia in termini diametrici che di altezza.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.591664990782109

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	661	Altitudine minima	533
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	66
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Latifoglie varie
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Latifoglie varie	Specie accessoria 2	Acero campestre
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Roverella

Descrizione libera	Fustaia transitoria a prevalenza di cerro con latifoglie varie (roverella, castagno, acero campestre, orniello).

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	20
Provvigione a ha	262
Incremendo medio	3.9
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	33
Provvigione totale	941

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0180900043	Numero	00043

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	43	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2032	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	74
Provvigione ha	262	Provvigione ha all'anno	290
Ripresa ha anno	67	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	242	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.321083817097219

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	581	Altitudine minima	486
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	23
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	21 - 30
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime di cerro di scadente fertilità.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.43639513425466103

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	589	Altitudine minima	559
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Larice giapponese	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino nero con altre conifere ed associate latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.17850188031774

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	667	Altitudine minima	653
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cipresso comune
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cipresso comune	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con cipresso comune.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	701-750 mc/ha
Altezza dominante	29
Diametro medio	27
Provvigione a ha	740
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	21
Area basimetrica ad ha	60
Provvigione totale	132

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0181200055	Numero	00055

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	55	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2034	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	64
Provvigione ha	740	Provvigione ha all'anno	855
Ripresa ha anno	213	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	38	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.169665864140645

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	672	Altitudine minima	608
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di latifoglie a prevalenza di cerro probabilmente di origine artificiale con orniello spontaneo da seme.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	20
Provvigione a ha	274
Incremendo medio	3.9
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	33
Provvigione totale	656

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.166801541386102

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	610	Altitudine minima	561
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di latifoglie con Cerro e Roverella prevalenti

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.190200351267797

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	707	Altitudine minima	632
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinaturalizzazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.289977470719256

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	662	Altitudine minima	638
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con douglasia.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	701-750 mc/ha
Altezza dominante	29
Diametro medio	27
Provvigione a ha	740
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	21
Area basimetrica ad ha	66
Provvigione totale	214

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0181600044	Numero	00044

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	44	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2032	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	62
Provvigione ha	740	Provvigione ha all'anno	835
Ripresa ha anno	206	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	59	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.711782829665579

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	702	Altitudine minima	629
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Douglasia	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista a struttura irregolare con Pino Douglasia e latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.21437966366112202

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	610	Altitudine minima	588
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di latifoglie varie a struttura irregolare

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.5666881048047451

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	582	Altitudine minima	512
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	66
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.263054565491813

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	710	Altitudine minima	676
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere varie con douglasia e pino nero, con presenza di latifoglie quali orniello, cerro, acero campestre.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	701-750 mc/ha
Altezza dominante	31
Diametro medio	31
Provvigione a ha	740
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900
Altezza media	22
Area basimetrica ad ha	59
Provvigione totale	934

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0182000045	Numero	00045

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	45	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2032	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Età prevalente	62
Provvigione ha	740	Provvigione ha all'anno	835
Ripresa ha anno	206	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	261	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 006A019

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	25.2737

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	7,034110786235751	006A01901
02	Cedui in gestione ordinaria	0,140082401055539	006A01902
03	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	0,193835238857102	006A01903
04	Cedui in gestione ordinaria	0,184926753136329	006A01904
05	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	0,57645410704487	006A01905

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
006A006	sbarra

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Superficie totale ha	7.034110786235751

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	678	Altitudine minima	459
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	65
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	20
Provvigione a ha	258
Incremendo medio	3.8
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	33
Provvigione totale	1814

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0190100038	Numero	00038

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	38	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2031	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	72
Provvigione ha	258	Provvigione ha all'anno	283
Ripresa ha anno	90	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	459	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.140082401055539

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	589	Altitudine minima	571
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	10
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	6 - 10
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime misto di Cerro e Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.193835238857102

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	455	Altitudine minima	453
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Douglasia di media fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.184926753136329

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	473	Altitudine minima	452
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	25
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	21 -
Composizione	Puro	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime degradato con scarsi accrescimenti sia in termini diametrici che di altezza.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.57645410704487

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	548	Altitudine minima	524
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	65
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	61 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	70
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	30
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia rada di douglasia recentemente diradata con residuali piante di castagno. Sottobosco a tratti denso con f carbonai.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.258357777259476

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	519	Altitudine minima	509
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	65
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	61 -
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia rada di douglasia recentemente diradata con residuali piante di castagno. Sottobosco a tratti denso con f carbonai.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.226483567878418

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	452	Altitudine minima	444
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	65
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di Cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	16.640231918955546

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	621	Altitudine minima	445
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	65
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro disforme per sviluppo e densità. I tratti con accrescimenti migliori e copertura compa settentrionali.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0190800125	Numero	00125

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	C5	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	65
Provvigione ha	300	Provvigione ha all'anno	300
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	485	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.019176985757407998

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	459	Altitudine minima	457
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A020

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	35.1266

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie miste in evoluzione controllata	1,342383560874348	006A02001
02	Boschi in evoluzione naturale	18,257468772006654	006A02002
03	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	5,82726085579069	006A02003
04	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	0,718972859535582	006A02004
05	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	0,413174028333806	006A02005

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Superficie totale ha	1.342383560874348

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	703	Altitudine minima	665
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	80
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	20
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cerro	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia rada di Pino nero con ampie zone arbustate e rinnovazione di latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	18.257468772006654

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	681	Altitudine minima	491
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	71
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco a struttura irregolare con ampie zone lacunose nella porzione nord della particella. Fertilità da media a scadente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	5.82726085579069

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	557	Altitudine minima	457
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	71
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 -
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento a prevalenza di Cerro. Nella parte assu, a confine con proprietà privata, presente una recente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.718972859535582

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	510	Altitudine minima	473
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino nero con rinnovazione affermata di Orniello

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.413174028333806

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	476	Altitudine minima	464
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di Douglasia con Cerro e Roverella, la conifera è maggiormente diffusa nella parte sud-est

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.002131741072412

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	681	Altitudine minima	562
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Rilevante (tra 60 e 80 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.289981222824828

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	519	Altitudine minima	472
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	61
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di scadente fertilità con copertura arbustiva a tratti abbondante con erica.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.205407945713657

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	476	Altitudine minima	459
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.15370393213033698

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	510	Altitudine minima	497
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.0517335561640269

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	700	Altitudine minima	657
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Conifere varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con latifoglie d'impianto (orniello e cerro) localmente affermate.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	651-700 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	25
Provvigione a ha	650
Incremendo medio	8.2
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	60
Provvigione totale	683

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0201000029	Numero	00029

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	29	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	60
Provvigione ha	740	Provvigione ha all'anno	814
Ripresa ha anno	200	Classe di ripresa	176-200 mc
Ripresa totale all'anno	210	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.528323480444562

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	680	Altitudine minima	628
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	71
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro e roverella	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria a prevalenza di Roverella con altre latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.229777820533153

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	585	Altitudine minima	557
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.7484178261226769

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	689	Altitudine minima	601
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Rilevante (tra 60 e 80 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.122711832896434

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	534	Altitudine minima	520
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A021

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	43.6534

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Boschi in evoluzione naturale	0,181420675102249	006A02101
02	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	34,29710302335188	006A02102
03	Altre superfici in evoluzione controllata	1,2478894355648371	006A02103
04	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	1,570574068122899	006A02104
05	Boschi in evoluzione naturale	0,785131095871719	006A02105

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
006A007	sbarra
006A012	area di sosta attrezzata

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Superficie totale ha	0.181420675102249

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	584	Altitudine minima	537
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	71
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento a prevalenza di Roverella

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	34.29710302335188

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	670	Altitudine minima	477
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Localmente si osservano porzioni ex prative

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0210200126	Numero	00126

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	C6	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella >50	Età prevalente	59
Provvigione ha	270	Provvigione ha all'anno	270
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	961	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.2478894355648371

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	531	Altitudine minima	484
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Rilevante (tra 60 e 80 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.570574068122899

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	519	Altitudine minima	489
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino silvestre
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie del piano dominante		
Prima specie in rinnovazione	Douglasia	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino silvestre	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere con douglasia e pino silvestre. Rinnovazione diffusa di douglasia e, nelle aree più aperte orniello.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.785131095871719

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	526	Altitudine minima	489
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia a struttura irregolare a prevalenza di Roverella a copertura disforme

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.253588291956487

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	571	Altitudine minima	550
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Rilevante (tra 60 e 80 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.590234184796829

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	580	Altitudine minima	535
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Rilevante (tra 60 e 80 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.951332805920072

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	546	Altitudine minima	513
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia a struttura stradificata con piano intermedio costituito da sporadici polloni

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.377667759069707

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	530	Altitudine minima	513
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.644433909799539

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Sociale e culturale
Compresa	Boschi con funzione turistico-ricreativa

Altitudine massima	491	Altitudine minima	475
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di cedro	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di specie non spontanee di minore pregio	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianto di cedro dell'Atlante	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cedro dell'Atlante in area di sosta.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0211000079	Numero	00079

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	79	N. modulo intervento	008
Tipologia intervento	Manutenzione aree e punti di sosta		
Descrizione intervento	Taglio degli alberi pericolanti con sfalcio dell'erba e decespugliamento.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	1
Turno	1		
Etichetta	MGLT		
Compresa	Boschi con funzione turistico-ricreativa		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cedro	Età prevalente	54
Provvigione ha	740	Provvigione ha all'anno	740
Ripresa ha anno	1	Classe di ripresa	0- 25 mc
Ripresa totale all'anno	1	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.753994055849803

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	499	Altitudine minima	472
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia a densità d'impianto con pino nero.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	751-800 mc/ha
Altezza dominante	36
Diametro medio	37
Provvigione a ha	786
Incremendo medio	14.5
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	32
Area basimetrica ad ha	69
Provvigione totale	1380

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0211100030	Numero	00030

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	30	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	60
Provvigione ha	786	Provvigione ha all'anno	865
Ripresa ha anno	228	Classe di ripresa	226-250 mc
Ripresa totale all'anno	400	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 006A022

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	23.6145

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie miste in gestione ordinaria	3,092598220284497	006A02201
02	Fustaie miste in evoluzione controllata	2,128121948458348	006A02202
03	Altre superfici in evoluzione controllata	1,5828655245478271	006A02203
04	Boschi in evoluzione naturale	1,423621168341559	006A02204
05	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,258668443194497	006A02205

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Superficie totale ha	3.092598220284497

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie miste in gestione

Altitudine massima	694	Altitudine minima	618
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere e latifoglie con pino nero e roverella, orniello e cerro, anche quest'ultimo probabilmente sviluppo.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	751-800 mc/ha
Altezza dominante	26
Diametro medio	28
Provvigione a ha	780
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	22
Area basimetrica ad ha	59
Provvigione totale	2412

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0220100039	Numero	00039

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	39	N. modulo intervento	005
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie miste di conifere e latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2031	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDM		
Compresa	Fustaie miste in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	66
Provvigione ha	808	Provvigione ha all'anno	893
Ripresa ha anno	219	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	678	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.128121948458348

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	709	Altitudine minima	611
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	Roverella
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia rada di Pino nero e altre conifere (Cedro e Cipresso) e latifoglie varie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.5828655245478271

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	730	Altitudine minima	687
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.423621168341559

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	687	Altitudine minima	634
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia disetanea di latifoglie con cerro e roverella. Densità disforme con ampie zone lacunose colonizzate da arbusti.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.258668443194497

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	660	Altitudine minima	647
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	39
Uso forestale	Fustaia di cedro	Classe di età	31 - 40
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di specie non spontanee di minore pregio	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianto di cedro dell'Atlante	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di cedro dell'Atlante in scadenti condizioni vegetative con rinnovazione diffusa e compatta di orniello

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	501-550 mc/ha
Altezza dominante	25
Diametro medio	28
Provvigione a ha	534
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	21
Area basimetrica ad ha	60
Provvigione totale	138

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0220500040	Numero	00040

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	40	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di cedro.		
Anno previsto per l'intervento	2031	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di cedro	Età prevalente	46
Provvigione ha	534	Provvigione ha all'anno	615
Ripresa ha anno	153	Classe di ripresa	151-175 mc
Ripresa totale all'anno	40	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	9.505924561296334

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	707	Altitudine minima	569
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento a prevalenza di cerro con roverella.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.898256609948119

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	730	Altitudine minima	723
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	60
Grado evolutivo		Età prevalente	39
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	31 -
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cipresso comune
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cipresso comune	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Conifere varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Rimboschimento fallito con cipresso e pino nero ad ampie zone lacunose.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0220700127	Numero	00127

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	C7	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Età prevalente	39
Provvigione ha	530	Provvigione ha all'anno	530
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	36	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.847851258632192

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	730	Altitudine minima	700
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	58
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 -
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia stadiale mista con Pino e altre latifoglie già evolute

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.788943501451658

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	723	Altitudine minima	656
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Classe di età	51 -
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di latifoglie a struttura irregolare,zona non boscata in prossimità della strada forestale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.271986191869446

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	698	Altitudine minima	678
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.314899709379859

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	709	Altitudine minima	680
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.15179946100656

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	722	Altitudine minima	682
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	58
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con locale abbigliasia a densita colma.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Rilevati
Classe di provvigione	751-800 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	31
Provvigione a ha	794
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900
Altezza media	22
Area basimetrica ad ha	59
Provvigione totale	914

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0221200056	Numero	00056

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	56	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2034	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	68
Provvigione ha	794	Provvigione ha all'anno	910
Ripresa ha anno	226	Classe di ripresa	226-250 mc
Ripresa totale all'anno	260	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.348926107511897

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	730	Altitudine minima	696
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	58
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Latifoglie varie
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Latifoglie varie	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero a densità rada con presenza di rinnovazione di latifoglie, prevalentemente cerro e orniello, n affermata.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	751-800 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	31
Provvigione a ha	794
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900
Altezza media	22
Area basimetrica ad ha	59
Provvigione totale	1071

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0221300048	Numero	00048

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	48	N. modulo intervento	007
Tipologia intervento	Taglio raso fustaia		
Descrizione intervento	Rinaturalizzazione pinete artificiali. Sgombero del pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2033	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	RNIA		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	67
Provvigione ha	794	Provvigione ha all'anno	900
Ripresa ha anno	871	Classe di ripresa	801-850 mc
Ripresa totale all'anno	1175	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 006A023

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	32.2293

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Pascoli, coltivi e altre aree aperte	1,572208256846163	006A02301
02	Altre superfici in evoluzione controllata	0,591413285546936	006A02302
03	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	4,291465470157587	006A02303
04	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	3,708966444526463	006A02304
05	Cedui in gestione ordinaria	4,2890719972664755	006A02305

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Superficie totale ha	1.572208256846163

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	728	Altitudine minima	705
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Prateria a graminacee		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.591413285546936

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	742	Altitudine minima	733
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.291465470157587

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	707	Altitudine minima	619
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	61
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista da invecchiamento di specie quercine. Sporadiche conifere

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.708966444526463

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	656	Altitudine minima	547
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Latifoglie varie
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	bosco a struttura irregolare e disforme con ampie zone arbustate

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.2890719972664755

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	652	Altitudine minima	528
Pendenza media	30 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	19
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	11 - 20
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Latifoglie varie
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime a prevalenza di Cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.350275784778898

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	659	Altitudine minima	619
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Assente	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Douglasia cui si associa, nella porzione sud, per gruppi il Pino nero e latifoglie di invasione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0230600049	Numero	00049

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	49	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2033	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	68
Provvigione ha	786	Provvigione ha all'anno	890
Ripresa ha anno	236	Classe di ripresa	226-250 mc
Ripresa totale all'anno	319	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.554842609645985

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	672	Altitudine minima	649
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	39
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	31 - 40
Composizione	Mista	Percentuale conifere	70
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	30
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cerro	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di Pino nero con Douglasia e con Cerro di invasione

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.306921038297914

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	673	Altitudine minima	542
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Latifoglie varie
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di scadente fertilità con zone lacunose nella porzione nord-est

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.10695068967361

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	652	Altitudine minima	627
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.164898382052733

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	718	Altitudine minima	708
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	non pertinente	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Prateria a graminacee		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0231000143	Numero	00143

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	E3	N. modulo intervento	013
Tipologia intervento	Miglioramento prato-pascolo		
Descrizione intervento	Manutenzione dei prati mediante sfalcio.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	1
Turno	1		
Etichetta	MNTP		
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.253673038108926

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	741	Altitudine minima	740
Pendenza media	0 - 5 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Densità
Esboscabilità	Coefficiente di copertura
Grado evolutivo	Età prevalente
Uso forestale	Classe di età
Composizione	Percentuale conifere
Categoria forestale	Percentuale latifoglie
Tipo forestale	Numero ceppaie a

MATRICINATURA

Entità	Distribuzione
Specie A	Specie B
Diffusione % specie A	Diffusione % specie
Numero ad ha matricine nel primo turno	
Numero ad ha matricine in turni maggiori del	

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	
Prima specie in rinnovazione	Seconda specie in rinnovazione
Diffusione % prima specie	Diffusione % seconda specie
Posizione prima specie	Posizione seconda specie
Distribuzione prima specie	Distribuzione seconda specie
Stato vegetativo prima	Stato vegetativo seconda
Specie principale 1	Specie accessoria 1
Specie principale 2	Specie accessoria 2
Specie principale 3	Specie accessoria 3

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità
Marginabilità	assente	Frammentazione
Caratteristiche stazionali		
Tipologia vegetazione	Prateria a graminacee	
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3
Specie principale 2		Specie principale 4
Dotazioni		
Gestione precedente		
Rilievo floristico		
Degrado		
Valore pastorale	Nessuno	
Sistema di pascolo	Nessuno	
Calcolo del carico	Nessuno	
Periodi di pascolamento	assente	

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.236329995896875

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	685	Altitudine minima	673
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.21136558300442998

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	649	Altitudine minima	640
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.537614694182714

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	705	Altitudine minima	671
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.410448966233349

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	726	Altitudine minima	704
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.42928287046324604

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	714	Altitudine minima	706
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.238433250788879

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	742	Altitudine minima	738
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.28748833119371003

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	704	Altitudine minima	677
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	0
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.20515601073140302

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	702	Altitudine minima	680
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.776692174813198

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	630	Altitudine minima	579
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	61
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista da invecchiamento di specie quercine

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.890931711847946

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	704	Altitudine minima	658
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	61
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 - 80
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di cerro e roverella di fertilità scadente e aspetto senescente e intristito.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.6882290903349

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	744	Altitudine minima	715
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	61
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco irregolare che mantiene a tratti una fisionomia di ceduo con ceppaie invasate e polloni senescenti

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.43985584376980597

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	645	Altitudine minima	620
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	61
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 - 80
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	Acero campestre
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco disforme composto da latifoglie varie con sporadiche conifere

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.002471935013589

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	673	Altitudine minima	542
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	19
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	11 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Latifoglie varie
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime a prevalenza di Cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.578355422262941

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	651	Altitudine minima	619
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pioppo nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con locale douglasia.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	751-800 mc/ha
Altezza dominante	24
Diametro medio	31
Provvigione a ha	750
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900
Altezza media	22
Area basimetrica ad ha	59
Provvigione totale	433

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0232500050	Numero	00050

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	50	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2033	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	68
Provvigione ha	808	Provvigione ha all'anno	914
Ripresa ha anno	225	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	130	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.7864632927077589

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	622	Altitudine minima	583
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con locale douglasia.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	701-750 mc/ha
Altezza dominante	26
Diametro medio	31
Provvigione a ha	750
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	22
Area basimetrica ad ha	59
Provvigione totale	589

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0232600051	Numero	00051

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	51	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2033	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	68
Provvigione ha	808	Provvigione ha all'anno	914
Ripresa ha anno	225	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	177	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.412139626761479

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	694	Altitudine minima	681
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere e latifoglie con sporadiche piante di Douglasia

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.13939048045254301

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	699	Altitudine minima	686
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 -
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco rado e disforme, in cui il Pino versa in mediocri condizioni

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.439658456105646

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	673	Altitudine minima	655
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro con sporadiche piante di Douglasia

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.32827027563192

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	644	Altitudine minima	632
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di Pino nero e Douglasia

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A024

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	33.1038

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	4,519021108038628	006A02401
02	Altre superfici in evoluzione controllata	0,5030941712858851	006A02402
03	Pascoli, coltivi e altre aree aperte	2,2475949230541317	006A02403
04	Altre superfici	0,180209612909207	006A02404
05	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	3,305434911326025	006A02405

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
006A004	laghetto antincendio

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Superficie totale ha	4.519021108038628

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	673	Altitudine minima	549
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro con roverella.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	20
Provvigione a ha	234
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	33
Provvigione totale	1057

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0240100057	Numero	00057

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	57	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2034	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	69
Provvigione ha	234	Provvigione ha all'anno	267
Ripresa ha anno	63	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	285	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.5030941712858851

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	654	Altitudine minima	630
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.2475949230541317

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	723	Altitudine minima	681
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Prateria a graminacee		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.180209612909207

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	685	Altitudine minima	681
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Lagheto AIB con relativa area di rispetto

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.305434911326025

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	715	Altitudine minima	604
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento, scadente, a densità scarsa, con piante affrancate caratterizzate da fusti ramosi e malformati.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.4719904740032073

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	684	Altitudine minima	610
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento, scadente, a densità scarsa, con piante affrancate caratterizzate da fusti ramosi e malformati.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.9985749139792752

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	705	Altitudine minima	610
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Acero campestre	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco degradato con affioramenti rocciosi

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.3489611329779352

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	700	Altitudine minima	644
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero a densità d'impianto.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	801-850 mc/ha
Altezza dominante	36
Diametro medio	31
Provvigione a ha	808
Incremendo medio	6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	22
Area basimetrica ad ha	59
Provvigione totale	1089

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0240800052	Numero	00052

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	52	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2033	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	68
Provvigione ha	808	Provvigione ha all'anno	914
Ripresa ha anno	225	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	304	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.676283636550605

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	708	Altitudine minima	675
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero a densità d'impianto.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	801-850 mc/ha
Altezza dominante	36
Diametro medio	31
Provvigione a ha	808
Incremendo medio	6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	22
Area basimetrica ad ha	59
Provvigione totale	546

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0240900053	Numero	00053

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	53	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2033	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	68
Provvigione ha	808	Provvigione ha all'anno	914
Ripresa ha anno	225	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	153	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.263122494550934

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	676	Altitudine minima	668
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.070111359824799

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	696	Altitudine minima	692
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Prateria a graminacee		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.469533574668309

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	720	Altitudine minima	671
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.4142651064604412

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	653	Altitudine minima	538
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro con altre latifoglie, di fertilità scadente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	9.63560026037991

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	705	Altitudine minima	558
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro con roverella.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	20
Provvigione a ha	234
Incremendo medio	3.9
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	15
Area basimetrica ad ha	33
Provvigione totale	1738

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0241400058	Numero	00058

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	58	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2034	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	69
Provvigione ha	234	Provvigione ha all'anno	267
Ripresa ha anno	63	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	469	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 006A025

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	25.0416

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	1,585897130214743	006A02501
02	Cedui in gestione ordinaria	3,5802767526833574	006A02502
03	Boschi in evoluzione naturale	0,848463137604343	006A02503
04	Cedui in evoluzione controllata	0,312609402221348	006A02504
05	Cedui in gestione ordinaria	7,057228476198995	006A02505

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Superficie totale ha	1.585897130214743

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	533	Altitudine minima	480
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria a prevalenza di Cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.5802767526833574

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	698	Altitudine minima	536
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	18
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	11 - 20
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime misto con cerro, roverella e orniello. Matricinatura con cerro. Fertilità scadente.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.848463137604343

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	675	Altitudine minima	579
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	Ciliegio
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Acero campestre

Descrizione libera	Bosco irregolare di castagno con cerro, roverella, ciliegio, carpino nero, acero campestre a densità disforme. Il p piedi.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.312609402221348

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	649	Altitudine minima	628
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Ceduo invecchiato di cerro	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo invecchiato a prevalenza di Cerro a struttura disforme

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	7.057228476198995

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	660	Altitudine minima	535
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	13
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	11 - 20
Composizione	Puro	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Carpino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Giovane ceduo a regime puro di cerro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.479459473089129

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	599	Altitudine minima	559
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	Ciliegio
Specie principale 3		Specie accessoria 3	Acero campestre

Descrizione libera	Bosco irregolare di castagno con cerro, roverella, ciliegio, carpino nero, acero campestre a densità disforme. Il p piedi.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.1700244883859074

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	689	Altitudine minima	567
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	18
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	11 - 20
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime misto con cerro, roverella e orniello. Matricinatura con cerro. Fertilità scadente.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.45461017647809404

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	711	Altitudine minima	664
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Ceduo invecchiato di cerro	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo invecchiato a prevalenza di Cerro di scadente fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.7262277087781109

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	647	Altitudine minima	620
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Ceduo invecchiato di cerro	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo invecchiato a prevalenza di Cerro di fertilità scadente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	5.554908754729294

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	666	Altitudine minima	524
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	13
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	11 - 20
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Carpino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime a prevalenza di Cerro, di media scadente fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.271844632744044

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	682	Altitudine minima	639
Pendenza media	5 - 15 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	13
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	11 - 20
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Carpino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime a prevalenza di Cerro, di media scadente fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A026

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	31.3982

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	2,894055028334062	006A02601
02	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	1,8508885070662708	006A02602
03	Altre superfici in evoluzione controllata	0,44227842067173895	006A02603
04	Altre superfici in evoluzione controllata	5,924333604973822	006A02604
05	Altre superfici in evoluzione controllata	0,610347503528883	006A02605

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Superficie totale ha	2.894055028334062

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	655	Altitudine minima	542
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento a prevalenza di specie quercine

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.8508885070662708

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	684	Altitudine minima	585
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro e Castagno, derivata da ex castagneto da frutto. Castagno in pessimo sta fitosanitario

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.44227842067173895

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	721	Altitudine minima	699
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	5.924333604973822

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	724	Altitudine minima	600
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.610347503528883

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	687	Altitudine minima	672
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.8684106311530689

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	675	Altitudine minima	650
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità
Marginabilità	assente	Frammentazione
Caratteristiche stazionali		
Tipologia vegetazione	Prateria graminacee con alberata di latifoglie	
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3
Specie principale 2		Specie principale 4
Dotazioni		
Gestione precedente		
Rilievo floristico		
Degrado		
Valore pastorale	Nessuno	
Sistema di pascolo	Nessuno	
Calcolo del carico	Nessuno	
Periodi di pascolamento	assente	

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.324794885713572

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	707	Altitudine minima	630
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento a prevalenza di cerro con roverella, caratterizzata da una densità scarsa e da piante globosa.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.645809512335784

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	674	Altitudine minima	652
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	bosco disforme e degradato

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.015925969298743

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	631	Altitudine minima	570
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	68
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco a struttura irregolare e disforme

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	10.848816018459855

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	730	Altitudine minima	569
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	60
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento irregolare, localmente a copertura rada con aree colonizzate da piante arbustive. Nel orniello.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.073299986045132

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	643	Altitudine minima	593
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Classe di età	61 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco di scadente fertilità a prevalenza di Cerro, con residuale Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.349255285592866

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	690	Altitudine minima	632
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.373394429435371

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	607	Altitudine minima	582
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di castagno	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco irregolare di Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.314191562213295

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	678	Altitudine minima	669
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.8623512656291021

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	688	Altitudine minima	645
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A027

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	36.5669

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	1,813674630044331	006A02701
02	Altre superfici in evoluzione controllata	1,465376715832911	006A02702
03	Cedui in gestione ordinaria	4,1341511356152925	006A02703
04	Cedui in gestione ordinaria	4,706287760384538	006A02704
05	Altre superfici in evoluzione controllata	2,686047141253784	006A02705

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Superficie totale ha	1.813674630044331

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	714	Altitudine minima	686
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero a densità d'impianto.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	651-700 mc/ha
Altezza dominante	24
Diametro medio	29
Provvigione a ha	680
Incremendo medio	4.5
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	20
Area basimetrica ad ha	59
Provvigione totale	1233

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0270100054	Numero	00054

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	54	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2033	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	68
Provvigione ha	808	Provvigione ha all'anno	914
Ripresa ha anno	225	Classe di ripresa	201-225 mc
Ripresa totale all'anno	409	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.465376715832911

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	748	Altitudine minima	707
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Rilevante (tra 60 e 80 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.1341511356152925

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	713	Altitudine minima	578
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	9
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Giovane ceduo a prevalenza di cerro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.706287760384538

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	719	Altitudine minima	522
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Rilevante (tra 60 e 80 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	14
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	11 - 20
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo giovane a prevalenza di cerro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.686047141253784

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	714	Altitudine minima	632
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.9481978584510249

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	724	Altitudine minima	674
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Rilevante (tra 60 e 80 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.943413284976117

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	660	Altitudine minima	519
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	39
Uso forestale	Ceduo invecchiato di cerro	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Carpino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo invecchiamto a prevalenza di cerro con roverella con carpino nero lungo gli impluvi.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.32003331999559903

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	632	Altitudine minima	615
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.745547169073187

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	692	Altitudine minima	656
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.333806098219235

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	695	Altitudine minima	635
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco in evoluzione naturale verso l'alto fusto

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.518484394547617

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	740	Altitudine minima	711
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.37904249082249597

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	720	Altitudine minima	700
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	7.5633231280857744

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	754	Altitudine minima	642
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.199789922597818

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	592	Altitudine minima	556
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	39
Uso forestale	Ceduo invecchiato di cerro	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo invecchiato a prevalenza di cerro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.288762898976961

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	670	Altitudine minima	578
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	39
Uso forestale	Ceduo invecchiato di cerro	Classe di età	31 - 40
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo invecchiato a prevalenza di cerro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.520978965734089

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	742	Altitudine minima	699
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A028

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	14.8075

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	0,353647201203369	006A02801
02	Pascoli, coltivi e altre aree aperte	0,63126884239465	006A02802
03	Altre superfici in evoluzione controllata	8,937290984008348	006A02803
04	Altre superfici in evoluzione controllata	1,3276462691362019	006A02804
05	Altre superfici in evoluzione controllata	0,915787423820701	006A02805

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Superficie totale ha	0.353647201203369

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	690	Altitudine minima	666
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	30
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	21 - 30
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di Pino nero e Cedro, con radure

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.63126884239465

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	538	Altitudine minima	509
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	bu
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	as
Stato di manutenzione	pessimo	Meccanizzabilità	di
Marginabilità	assente	Frammentazione	as
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Area coltivata		
Specie principale 1	Olivo	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	8.937290984008348

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	690	Altitudine minima	499
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.3276462691362019

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	647	Altitudine minima	600
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.915787423820701

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	656	Altitudine minima	623
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.36333253871760096

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	620	Altitudine minima	602
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinaturalizzazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.844885031265532

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	688	Altitudine minima	644
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.222637723446917

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	690	Altitudine minima	647
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.211046805096231

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	622	Altitudine minima	579
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A029

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	24.3429

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	2,231700939123612	006A02901
02	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	0,40000719510694	006A02902
03	Altre superfici	0,184185567443632	006A02903
04	Altre superfici in evoluzione controllata	0,627098529285018	006A02904
05	Cedui in gestione ordinaria	4,411067656339851	006A02905

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
006A005	laghetto antincendio

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	2.231700939123612

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	790	Altitudine minima	717
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	56
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Abete bianco
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Abete bianco	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con abete bianco, cedro e sporadiche latifoglie in buone condizioni di discreto sviluppo.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.40000719510694

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	726	Altitudine minima	711
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	39
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	31 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Abete bianco
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Abete bianco	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Perticaia di pino nero con abete bianco e sporadiche latifoglie a densità scarsa, le aree più lacunose sono colonizzate da erica.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	451-500 mc/ha
Altezza dominante	26
Diametro medio	31
Provvigione a ha	468
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	22
Area basimetrica ad ha	59
Provvigione totale	487

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0290200031	Numero	00031

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	31	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	45
Provvigione ha	468	Provvigione ha all'anno	530
Ripresa ha anno	141	Classe di ripresa	126-150 mc
Ripresa totale all'anno	57	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.184185567443632

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	735	Altitudine minima	728
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Lagheto AIB con relativa area di rispetto

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.627098529285018

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	771	Altitudine minima	738
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.411067656339851

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	650	Altitudine minima	580
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Ceduo invecchiato di castagno >50	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo invecchiato a prevalenza di castagno, costituito da ex piante da frutto e da ceppaie rade e molto grandi c morti.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	24
Provvigione a ha	270
Incremendo medio	3.9
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	13
Area basimetrica ad ha	40
Provvigione totale	1190

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0290500016	Numero	00016

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	16	N. modulo intervento	006
Tipologia intervento	Taglio ceduo semplice invecchiato		
Descrizione intervento	Taglio del ceduo.		
Anno previsto per l'intervento	2027	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TCED		
Compresa	Cedui in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Ceduo invecchiato di castagno >50	Età prevalente	72
Provvigione ha	270	Provvigione ha all'anno	281
Ripresa ha anno	196	Classe di ripresa	176-200 mc
Ripresa totale all'anno	865	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.8383353151829801

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	733	Altitudine minima	660
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	8
Uso forestale	Ceduo di castagno	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	elevata	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo di castagno a regime

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.676632376828522

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	730	Altitudine minima	660
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di Castagno con Cerro, Roverella e altre latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.189074965727003

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	773	Altitudine minima	656
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	58
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento a prevalenza di cerro irregolare con ampie zone lacunose colonizzate da specie arbustive.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.223196181315032

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	446	Altitudine minima	420
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Prato a graminacee con inclusoni arboree		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.3570531858533161

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	515	Altitudine minima	469
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di latifoglie con Castagno, Cerro e altre specie mesofile

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.09619323448909001

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	767	Altitudine minima	742
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Acero campestre	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.2647131249709522

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	682	Altitudine minima	544
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	10
Uso forestale	Ceduo di castagno	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	elevata	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime di Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.195777247292455

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	480	Altitudine minima	470
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco disforme di varie latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.003686364503484

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	787	Altitudine minima	730
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nessuna

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	56
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Douglasia	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista conifere latifoglie a densità disforme

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.5638059937499

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	655	Altitudine minima	530
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	10
Uso forestale	Ceduo di castagno	Classe di età	6 - 10
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime di Castagno

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.9137548657062771

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	728	Altitudine minima	692
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A030

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	44.4776

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Boschi in evoluzione naturale	2,08288946891306	006A03001
02	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	1,7761355200784281	006A03002
03	Boschi in evoluzione naturale	1,954216918274388	006A03003
04	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	6,07674320874296	006A03004
05	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	4,997517178345537	006A03005

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	2.08288946891306

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	669	Altitudine minima	532
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Assente	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	51
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia a densità d'impianto mai diradata.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.7761355200784281

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	695	Altitudine minima	653
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	56
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con presenza di rinnovazione affermata e densa a prevalenza di orniello con altre latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	651-700 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	23
Provvigione a ha	672
Incremendo medio	12
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	62
Provvigione totale	1193

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0300200061	Numero	00061

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	61	N. modulo intervento	007
Tipologia intervento	Taglio raso fustaia		
Descrizione intervento	Rinaturalizzazione pinete artificiali. Sgombero del pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2035	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	RNIA		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	67
Provvigione ha	672	Provvigione ha all'anno	782
Ripresa ha anno	740	Classe di ripresa	701-750 mc
Ripresa totale all'anno	1315	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.954216918274388

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	578	Altitudine minima	469
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco irregolare di castagno proveniente dalla conversione di castagneto da frutto struttura eterogenea per l'alt... morte.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	6.07674320874296

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	730	Altitudine minima	590
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento mista con cerro e roverella. Il castagno, un tempo ampiamente presente, è ormai qu discreta.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.997517178345537

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	730	Altitudine minima	504
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro e roverella	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria mista di cerro e roverella di mediocre fertilità costituita da polloni affrancati e da piante da seme.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	21
Provvigione a ha	263
Incremendo medio	3.8
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	29
Provvigione totale	1314

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0300500062	Numero	00062

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	62	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2035	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro e roverella	Età prevalente	80
Provvigione ha	263	Provvigione ha all'anno	299
Ripresa ha anno	54	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	272	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.9743708546155183

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	699	Altitudine minima	642
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro e roverella	Classe di età	61 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Pino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro di media-scadente fertilità con nuclei di pino nero in prossimità della viabilità e piante particella.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0300600128	Numero	00128

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	C8	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro e roverella	Età prevalente	69
Provvigione ha	300	Provvigione ha all'anno	300
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	120	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	6.24017432378532

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	665	Altitudine minima	488
Pendenza media	30 - 60 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di latifoglie varie di scadente fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0300700129	Numero	00129

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	C9	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Età prevalente	60
Provvigione ha	280	Provvigione ha all'anno	280
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	187	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.460663363252487

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	733	Altitudine minima	714
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	56
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	80
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	20
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cerro	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia rada a prevalenza di pino nero con latifoglie d'impianto. Densità rada.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.487825844522053

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	738	Altitudine minima	715
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.114669188609952

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	670	Altitudine minima	664
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	56
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino nero con rinnovazione affermata di Orniello

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	651-700 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	23
Provvigione a ha	672
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	61
Provvigione totale	77

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0301000063	Numero	00063

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	63	N. modulo intervento	007
Tipologia intervento	Taglio raso fustaia		
Descrizione intervento	Rinaturalizzazione pinete artificiali. Sgombero del pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2035	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	RNIA		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	67
Provvigione ha	672	Provvigione ha all'anno	782
Ripresa ha anno	740	Classe di ripresa	701-750 mc
Ripresa totale all'anno	85	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.288117599030957

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	494	Altitudine minima	470
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Assente	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	51
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia pura di douglasia.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	801-850 mc/ha
Altezza dominante	35
Diametro medio	35
Provvigione a ha	820
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900
Altezza media	31
Area basimetrica ad ha	89
Provvigione totale	236

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0301100032	Numero	00032

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	32	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	57
Provvigione ha	820	Provvigione ha all'anno	906
Ripresa ha anno	309	Classe di ripresa	301-325 mc
Ripresa totale all'anno	89	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.8892352804872499

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	674	Altitudine minima	470
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	80
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di latifoglie varie, da invecchiamento, con sporadiche conifere

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.922071847620606

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	554	Altitudine minima	489
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di castagno	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Castagneti	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Castagneto acidofilo	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Castagno	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco derivante dall'abbandono di castagneto da frutto con invasione spontanea di latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0301300130	Numero	00130

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	D0	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di castagno	Età prevalente	999
Provvigione ha	300	Provvigione ha all'anno	300
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	28	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.257140096247249

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	724	Altitudine minima	642
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Pino nero
Specie principale 3	Acero campestre	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento a prevalenza di Cerro con Roverella e altre latifoglie. Sporadico Pino nero a contatto co viabilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	5.059033532484318

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	678	Altitudine minima	491
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	60
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di media fertilità a densità disforme. Presenza di ampie zone lacunose colonizzate da carbonai.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.292478525710388

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	707	Altitudine minima	677
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Assente	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	56
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	51 -
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	Castagno
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia pura.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	35
Diametro medio	35
Provvigione a ha	890
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	31
Area basimetrica ad ha	89
Provvigione totale	260

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0301600033	Numero	00033

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	33	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	62
Provvigione ha	890	Provvigione ha all'anno	976
Ripresa ha anno	333	Classe di ripresa	326-350 mc
Ripresa totale all'anno	97	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.425127666688687

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	556	Altitudine minima	501
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro e roverella	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria mista con cerro e roverella costituita da polloni affrancati e da piante da seme.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	21
Provvigione a ha	263
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	600 - 900
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	29
Provvigione totale	637

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0301700064	Numero	00064

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	64	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2035	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro e roverella	Età prevalente	80
Provvigione ha	263	Provvigione ha all'anno	299
Ripresa ha anno	54	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	132	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	4.079567050633044

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	610	Altitudine minima	470
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia stadiale di specie quercine caducifoglie, con forti limitazioni stazionali alle quote maggiori

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A031

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	30.8463

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	1,6445516682754209	006A03101
02	Pascoli, coltivi e altre aree aperte	0,715059253330017	006A03102
03	Altre superfici in evoluzione controllata	1,8995572787153538	006A03103
04	Altre superfici	0,17578288919173599	006A03104
05	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	1,986660865568835	006A03105

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia
006A012	Giglioni
006A013	Il Colle
006A014	Il Colle

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	1.6445516682754209

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	498	Altitudine minima	460
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	80
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	20
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Abete bianco
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Abete bianco	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con sporadico Abete bianco, spesso morto in piedi e con presenza di latifoglie di impianto e Orniello.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	601-650 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	23
Provvigione a ha	648
Incremendo medio	12
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	62
Provvigione totale	1065

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0310100065	Numero	00065

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	65	N. modulo intervento	007
Tipologia intervento	Taglio raso fustaia		
Descrizione intervento	Rinaturalizzazione pinete artificiali. Sgombero del pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2036	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	RNIA		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	66
Provvigione ha	648	Provvigione ha all'anno	765
Ripresa ha anno	729	Classe di ripresa	701-750 mc
Ripresa totale all'anno	201	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.715059253330017

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	481	Altitudine minima	464
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Aree marginali a vegetazione in evoluzione		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.8995572787153538

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	508	Altitudine minima	442
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinaturalizzazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.17578288919173599

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	508	Altitudine minima	506
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Area edificata denominata Il Colle. Non in uso

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.986660865568835

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	0	Altitudine minima	359
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	Cedro dell'Atlante
Specie principale 3	Pino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di latifoglie varie, principalmente Cerro e Roverella, conifera con Pino nero, Douglasia, Cedro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.147832740913887

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	498	Altitudine minima	429
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	71
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Acero campestre	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro e altre latifoglie con castagno nella porzione a Nord

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0310600131	Numero	00131

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	D1	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	71
Provvigione ha	330	Provvigione ha all'anno	330
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	95	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.509821771445009

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	485	Altitudine minima	388
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	71
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro, con aree lacunose

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.951480052914936

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	507	Altitudine minima	439
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	71
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di cerro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	22
Provvigione a ha	327
Incremendo medio	4.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	36
Provvigione totale	638

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0310800066	Numero	00066

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	66	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2036	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Età prevalente	83
Provvigione ha	327	Provvigione ha all'anno	374
Ripresa ha anno	95	Classe di ripresa	76-100 mc
Ripresa totale all'anno	187	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.823642371839835

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	477	Altitudine minima	429
Pendenza media	30 - 60 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	64
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	30
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	70
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Douglasia
Specie principale 3	Pino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere e latifoglie, con Cerro Roverella cui si associano Pino e Douglasia

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0310900132	Numero	00132

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	D2	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	54
Provvigione ha	590	Provvigione ha all'anno	590
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	73	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.3182965555477812

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	435	Altitudine minima	383
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Acero campestre	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista a prevalenza di Roverella, con altre latifoglie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.27550166996563796

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	516	Altitudine minima	486
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	70	Diffusione % seconda specie	30
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino nero e Douglasia, quest'ultima spesso morta in piedi. presenza di piano intermedio affermato e c Cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0311100067	Numero	00067

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	67	N. modulo intervento	007
Tipologia intervento	Taglio raso fustaia		
Descrizione intervento	Rinaturalizzazione pinete artificiali. Sgombero del pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2036	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	RNIA		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	66
Provvigione ha	648	Provvigione ha all'anno	765
Ripresa ha anno	729	Classe di ripresa	701-750 mc
Ripresa totale all'anno	201	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.158399189746333

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	452	Altitudine minima	392
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	80
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	20
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cipresso comune
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cipresso comune	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di pino nero e cipresso comune e latifoglie a densità rada e disforme.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0311200133	Numero	00133

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	D3	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Età prevalente	54
Provvigione ha	740	Provvigione ha all'anno	740
Ripresa ha anno	48	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	108	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	4.332581722580771

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	425	Altitudine minima	359
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di conifere varie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	80
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	20
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cipresso comune	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere, impiantata per pedale e latifoglie diffuse per gruppi

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.30546657031983

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	443	Altitudine minima	420
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Prateria a graminacee con alberate a latifoglie		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.6610192152272499

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	442	Altitudine minima	416
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Aree coltivate in abbandono		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.148982618937962

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	481	Altitudine minima	472
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.092766343727062

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	486	Altitudine minima	481
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Area edificata denominata 1 Gigliofi. Non utilizzata

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.189788649855298

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Altre superfici

Altitudine massima	517	Altitudine minima	488
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	Area edificata in Colle. Non in uso

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.035078938959353004

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	378	Altitudine minima	376
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di latifoglie varie da invecchiamento

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.3286101259058571

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	422	Altitudine minima	370
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Molto difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Mista	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Roverella	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Pino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di latifoglie a prevalenza di Roverella

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.193324827282317

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	449	Altitudine minima	433
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia a prevalenza di pino nero con presenza abbondante di latifoglie nel piano dominato e intermedio costitu orniello.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	601-650 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	23
Provvigione a ha	648
Incremendo medio	8
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	62
Provvigione totale	125

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0312100034	Numero	00034

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	34	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	60
Provvigione ha	648	Provvigione ha all'anno	712
Ripresa ha anno	189	Classe di ripresa	176-200 mc
Ripresa totale all'anno	36	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.085046815316286

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	472	Altitudine minima	466
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Douglasia
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pioppo nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Douglasia	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco residuale a prevalenza di Pino nero con latifoglie spontanee

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.965943356336601

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	515	Altitudine minima	476
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	54
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro costituita da polloni affrancati e da piante da seme.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	21
Provvigione a ha	249
Incremendo medio	4.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	36
Provvigione totale	240

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0312300068	Numero	00068

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	68	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2036	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	66
Provvigione ha	249	Provvigione ha all'anno	294
Ripresa ha anno	75	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	73	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Particella fisiocratica chiavePF 006A032

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	CASTIGLION FIORENTINO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	37.8192

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Cedui in gestione ordinaria	9,476477778582861	006A03201
02	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	1,976990766829869	006A03202
03	Fustaie miste in evoluzione controllata	0,849828137078881	006A03203
04	Fustaie di conifere in gestione ordinaria	1,1604568249684761	006A03204
05	Fustaie miste in evoluzione controllata	2,418098562647618	006A03205

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza
006A002	storica

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura
006A008	sbarra

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia
006A015	Le Terrigie
006A016	Casa Le Stroscie

ISTITUZIONI

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	9.476477778582861

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	695	Altitudine minima	518
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	2
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	1 - 5
Composizione	Puro	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Giovane ceduo a prevalenza di cerro recentemente tagliato.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.976990766829869

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	757	Altitudine minima	719
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 - 50
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero a densità rada con porzione di cedro dell'Atlante in pessimo stato fitosanitario con molte pia cerro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	551-600 mc/ha
Altezza dominante	27
Diametro medio	23
Provvigione a ha	588
Incremendo medio	12
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	19
Area basimetrica ad ha	62
Provvigione totale	1162

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0320200035	Numero	00035

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	35	N. modulo intervento	002
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di pino nero.		
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDP		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Età prevalente	55
Provvigione ha	588	Provvigione ha all'anno	652
Ripresa ha anno	342	Classe di ripresa	326-350 mc
Ripresa totale all'anno	173	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.849828137078881

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	742	Altitudine minima	721
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	56
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	60
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	40
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Douglasia	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere e latifoglie a densità rada con aree schiantate.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dato piano precedente
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.1604568249684761

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di conifere in gestione

Altitudine massima	682	Altitudine minima	647
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	eccessiva
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Classe di età	41 - 50
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di douglasia densa impiantata su terreno con gradoni in pietra.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	801-850 mc/ha
Altezza dominante	35
Diametro medio	35
Provvigione a ha	810
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50
Altezza media	31
Area basimetrica ad ha	89
Provvigione totale	939

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0320400036	Numero	00036

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	36	N. modulo intervento	003
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di conifere a prevalenza di douglasia.		
Anno previsto per l'intervento	2030	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDD		
Compresa	Fustaie di conifere in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di douglasia	Età prevalente	55
Provvigione ha	810	Provvigione ha all'anno	898
Ripresa ha anno	356	Classe di ripresa	351-375 mc
Ripresa totale all'anno	307	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.418098562647618

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	556	Altitudine minima	503
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	46
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	41 - 50
Composizione	Mista	Percentuale conifere	20
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	80
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere e latifoglie con douglasia, cerro, roverella, orniello. La douglasia è in gran parte morta i impianto.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0320500134	Numero	00134

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	D4	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Età prevalente	46
Provvigione ha	460	Provvigione ha all'anno	460
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	72	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.7802605902595912

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	546	Altitudine minima	489
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco misto di latifoglie a struttura irregolare

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.761962510146061

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	725	Altitudine minima	703
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	40
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Abete bianco
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Abete bianco	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero a densità disforme con presenza di aree schiantate. Rinnovazione diffusa di latifoglie, preval orniello.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.841406702487875

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	537	Altitudine minima	509
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Orniello
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Orniello	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Acero campestre	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di rinforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.095755661075886

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	570	Altitudine minima	469
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	57
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Cerro con Roverella da invecchiamento di ceduo di scadente fertilità

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.4402388180532957

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	559	Altitudine minima	461
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro con latifoglie mesofile

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.07137132313014

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	625	Altitudine minima	587
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di cerro con castagno e roverella.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.621299424426258

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	459	Altitudine minima	423
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	7
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	6 - 10
Composizione	Puro	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime di Cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.609010804895312

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	793	Altitudine minima	755
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.75573460243874

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	623	Altitudine minima	593
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Castagno	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.219122454982623

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	677	Altitudine minima	646
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.438525267983202

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	768	Altitudine minima	730
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	41 - 50
Composizione	Mista	Percentuale conifere	50
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	50
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Roverella	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Pineta scadente con presenza di Cerro e Orniello

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.49241358583885103

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	768	Altitudine minima	730
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	10
Grado evolutivo		Età prevalente	56
Uso forestale	Bosco temporaneamente privo di soprassuolo	Classe di età	51 - 60
Composizione	Mista	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Zona denudata per schianti con residuali piante di pino nero e con rinnovazione diffusa di latifoglie.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.86384501700243

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	590	Altitudine minima	557
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco a struttura irregolare

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	5.33933593322642

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	640	Altitudine minima	509
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	difficile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	59
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria a prevalenza di Cerro, con aree lacunose. Residuali piante di conifere nei pressi del rabbocato Terigie

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0321900135	Numero	00135

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	D5	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	59
Provvigione ha	570	Provvigione ha all'anno	570
Ripresa ha anno	40	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	214	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.6276940768791189

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	733	Altitudine minima	712
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Scarsa (fino al 20 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	56
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Abete bianco
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Abete bianco	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero con sporadico abete bianco di discreta fertilità.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1500 - 2000 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.14603720184518

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	553	Altitudine minima	508
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	impossibile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	46
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	41 - 50
Composizione	Mista	Percentuale conifere	30
Categoria forestale	Impianti di Douglasia	Percentuale latifoglie	70
Tipo forestale	Impianti di douglasia	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cerro
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Douglasia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cerro	Specie accessoria 2	Acero campestre
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia mista di conifere e latifoglie con Douglasia, Pino nero col si associano Cerro e Orniello

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A033

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	21.268

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	1,2018369540886489	006A03301
02	Altre superfici in evoluzione controllata	4,878366165370588	006A03302
03	Cedui in gestione ordinaria	4,220718367421618	006A03303
04	Cedui in evoluzione controllata	3,5565183602983947	006A03304
05	Fustaie di conifere in evoluzione controllata	1,1473052224735032	006A03305

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	1.2018369540886489

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	573	Altitudine minima	508
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	67
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Classe di età	61 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro, una parte lungo strada tagliata di recente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0330100136	Numero	00136

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	D6	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Età prevalente	67
Provvigione ha	296	Provvigione ha all'anno	296
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	36	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	4.878366165370588

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	720	Altitudine minima	619
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Rilevante (tra 60 e 80 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.220718367421618

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	624	Altitudine minima	518
Pendenza media	30 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	32
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	31 - 40
Composizione	Puro	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo a regime di cerro scadente con accrescimenti limitati.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.5565183602983947

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	703	Altitudine minima	535
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	48
Uso forestale	Ceduo invecchiato di cerro	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo invecchiato misto di Cerro e Castagno, quest'ultimo in pessimo stato

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.1473052224735032

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	684	Altitudine minima	646
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	46
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 - 50
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Cedro dell'Atlante
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cipresso comune	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero rada e disforme con latifoglie in rinnovazione e sottobosco a tratti denso con erica.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.157266275184669

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	685	Altitudine minima	631
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	40
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	31 - 40
Composizione	Pura	Percentuale conifere	100
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	0
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Orniello	Seconda specie in rinnovazione	Cerro
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di pino nero di contenuto sviluppo con zone lacunose con latifoglie in rinnovazione e soprassuolo a tratti erica.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.503021207792032

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	648	Altitudine minima	624
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	67
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria di cerro.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	22
Provvigione a ha	309
Incremendo medio	4.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	36
Provvigione totale	155

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0330700072	Numero	00072

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	72	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2038	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	81
Provvigione ha	309	Provvigione ha all'anno	362
Ripresa ha anno	92	Classe di ripresa	76-100 mc
Ripresa totale all'anno	47	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.6125108517334911

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	664	Altitudine minima	632
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	67
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro e roverella	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Roverella con Cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	2.020744470054167

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	659	Altitudine minima	604
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Abbondante (tra il 40 e il 60 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	52
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Classe di età	51 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia rada, con aree falciose invase da arbusti.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.646281896777591

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie miste in evoluzione controllata

Altitudine massima	728	Altitudine minima	691
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	46
Uso forestale	Fustaia di conifere e latifoglie	Classe di età	41 - 50
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Pino nero
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Pino nero	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Cedro dell'Atlante	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Bosco lacunoso con gruppi di Pino e latifoglie, che si alternano a zone arbustate

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	0.29642938787839396

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Cedui in evoluzione controllata

Altitudine massima	705	Altitudine minima	672
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Media	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	48
Uso forestale	Ceduo invecchiato di cerro	Classe di età	41 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Castagno
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Castagno	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo invecchiato a prevalenza di Cerro con Castagno residuale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.027032949784433

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di conifere in evoluzione controllata

Altitudine massima	728	Altitudine minima	689
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	46
Uso forestale	Fustaia di pino nero	Classe di età	41 - 50
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	90
Categoria forestale	Pinete di rimboschimento di Pino nero	Percentuale latifoglie	10
Tipo forestale	Pineta neutro-acidoclina di pino nero	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Latifoglie varie
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	con specie autoctone		
Prima specie in rinnovazione	Cerro	Seconda specie in rinnovazione	Ontano nero
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Pino nero	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Latifoglie varie	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia di Pino nero con associata localmente compenete a latifoglie. Numerose piante di Pino morte in piedi

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A034

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	16.9054

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	8,726610859943035	006A03401
02	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	3,080781539968643	006A03402
03	Pascoli, coltivi e altre aree aperte	1,6894754130084833	006A03403
04	Cedui in gestione ordinaria	2,577321788560469	006A03404
05	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	0,831225193507708	006A03405

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	8.726610859943035

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	557	Altitudine minima	364
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria pura di cerro con discreti accrescimenti.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	20
Diametro medio	22
Provvigione a ha	318
Incremendo medio	4.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	36
Provvigione totale	2775

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0340100070	Numero	00070

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	70	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2037	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	82
Provvigione ha	318	Provvigione ha all'anno	368
Ripresa ha anno	111	Classe di ripresa	101-125 mc
Ripresa totale all'anno	974	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	3.080781539968643

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	549	Altitudine minima	441
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	69
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro di fertilità da media a scadente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0340200137	Numero	00137

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	D7	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Età prevalente	69
Provvigione ha	320	Provvigione ha all'anno	320
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	32	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.6894754130084833

Legge 39	Non bosco
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Altre funzioni
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte

Altitudine massima	436	Altitudine minima	386
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva		Densità	
Esboscabilità		Coefficiente di copertura	
Grado evolutivo		Età prevalente	
Uso forestale		Classe di età	
Composizione		Percentuale conifere	
Categoria forestale		Percentuale latifoglie	
Tipo forestale		Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A		Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione			
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie		Diffusione % seconda specie	
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1		Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	
Classe di provvigione	
Altezza dominante	
Diametro medio	
Provvigione a ha	
Incremendo medio	
Dati relativi all'intero soprassuolo	
Numero piante ad ha	
Altezza media	
Area basimetrica ad ha	
Provvigione totale	

DANNI

Tipo 1		Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1		Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso	Basso	Giacitura	buona
Facies da sovrapascolo	assente	Opere di sistemazione sup	assenti
Stato di manutenzione	buono	Meccanizzabilità	facile
Marginabilità	assente	Frammentazione	assente
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione	Prateria a gramnacee		
Specie principale 1	Roverella	Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale	Nessuno		
Sistema di pascolo	Nessuno		
Calcolo del carico	Nessuno		
Periodi di pascolamento	assente		

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0340300144	Numero	00144

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	E4	N. modulo intervento	013
Tipologia intervento	Miglioramento prato-pascolo		
Descrizione intervento	Manutenzione dei prati mediante sfalcio.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	1
Turno	1		
Etichetta	MNTP		
Compresa	Pascoli, coltivi e altre aree aperte		
Prescrizioni			
Uso forestale		Età prevalente	
Provvigione ha		Provvigione ha all'anno	
Ripresa ha anno		Classe di ripresa	
Ripresa totale all'anno		Deroga LR39	
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	2.577321788560469

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	466	Altitudine minima	361
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	32
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	31 -
Composizione	A prevalenza di	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Pino nero	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo di cerro a densità scarsa con ceppaie rade e polloni localmente di dimensioni discrete.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	51-100 mc/ha
Altezza dominante	18
Diametro medio	11
Provvigione a ha	76
Incremendo medio	7.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	12
Area basimetrica ad ha	24
Provvigione totale	195

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0340400071	Numero	00071

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	71	N. modulo intervento	006
Tipologia intervento	Taglio ceduo semplice		
Descrizione intervento	Taglio del ceduo.		
Anno previsto per l'intervento	2037	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	TCED		
Compresa	Cedui in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Ceduo di cerro	Età prevalente	45
Provvigione ha	76	Provvigione ha all'anno	98
Ripresa ha anno	96	Classe di ripresa	76-100 mc
Ripresa totale all'anno	248	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	0.831225193507708

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	418	Altitudine minima	373
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	40
Uso forestale	Fustaia di latifoglie varie	Classe di età	31 - 40
Composizione	Mista	Percentuale conifere	10
Categoria forestale	Querceti di Roverella	Percentuale latifoglie	90
Tipo forestale	Querceto acidofilo di roverella e cerro	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia derivante da invasione di area agricola. Locale arbusteto

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Particella fisiocratica chiavePF 006A035

CARATTERI GENERALI

Complesso	ALPE DI POTI
Sezione	A
Comune	AREZZO
Ente Proprietario	Ente Terre Regionali Toscane
Ente Gestore	AREZZO - GESTIONE P.A.F.R.
Superficie ha	33.0316

ELENCO SOTTOPARTICELLE FISIONOMICHE

SF	Compresa	Superficie ha	chiavesf di sfb/ap/al
01	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	4,457536133460386	006A03501
02	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria	4,385043599535848	006A03502
03	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata	5,576793540660193	006A03503
04	Cedui in gestione ordinaria	4,642141803942808	006A03504
05	Altre superfici in evoluzione controllata	1,241325289036307	006A03505

EMERGENZE

chiaveEMER	Tipologia di emergenza

INFRASTRUTTURE

chiaveINFR	Tipologia Infrastruttura

UNITÀ EDILIZIE E FABBRICATI

chiaveUNED	Nome unità edilizia

ISTITUZIONI

Zona di Protezione (art.14 L.R. 3/94)

Superficie totale ha	4.457536133460386

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	645	Altitudine minima	530
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	68
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Mista	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	Carpino nero
Specie principale 3	Orniello	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria mista con cerro e roverella, e con latifogli varie spontanee e sporadico pino nero. Gli accresci altezza.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aree di saggio
Classe di provvigione	301-350 mc/ha
Altezza dominante	22
Diametro medio	22
Provvigione a ha	318
Incremendo medio	4.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	36
Provvigione totale	2775

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0350100080	Numero	00080

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	80	N. modulo intervento	009
Tipologia intervento	Interventi speciali di salvaguardia habitat		
Descrizione intervento	Interventi puntiformi finalizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.		
Anno previsto per l'intervento	2024	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	PNTF		
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	68
Provvigione ha	320	Provvigione ha all'anno	320
Ripresa ha anno	30	Classe di ripresa	26- 3 mc
Ripresa totale all'anno	134	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	4.385043599535848

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	553	Altitudine minima	453
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	51
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia transitoria pura con cerro e sporadica roverella di buona fertilità. Sottobosco con erica.

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	22
Diametro medio	22
Provvigione a ha	314
Incremendo medio	4.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	1200 - 1500
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	36
Provvigione totale	1400

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0350200073	Numero	00073

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	73	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2038	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia transitoria di cerro	Età prevalente	65
Provvigione ha	235	Provvigione ha all'anno	285
Ripresa ha anno	57	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	251	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	5.576793540660193

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	476	Altitudine minima	378
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud-Ovest

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	49
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	41 - 50
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di Cerro, a struttura coetaneiforme

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	4.642141803942808

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Cedui in gestione

Altitudine massima	530	Altitudine minima	376
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	2
Uso forestale	Ceduo di cerro	Classe di età	1 - 5
Composizione	Puro	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ceduo giovane a prevalenza di Cerro utilizzato di recente

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.241325289036307

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 4)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Altre superfici in evoluzione controllata

Altitudine massima	557	Altitudine minima	526
Pendenza media	15 - 30 per cento		
Accessibilità	media	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Rilevante (tra 60 e 80 per cento di copertura)	Densità	scarsa
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	70
Grado evolutivo		Età prevalente	999
Uso forestale	Bosco di neoformazione	Classe di età	Indeterminata
Composizione	Misto	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Arbusteti di post-coltura	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Ginestreto Cytisus scoparius	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Erica scoparia	Specie accessoria 1	
Specie principale 2		Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Ex coltivo/pascolo in fase di riforestazione naturale

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	1.9447990156818182

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Fustaie di latifoglie in evoluzione controllata

Altitudine massima	528	Altitudine minima	418
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Nord-Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Difficile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	51
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità	normale	Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento a struttura parzialmente disforme

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	3.876884834917274

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Naturalistica e per la conservazione della
Compresa	Boschi in evoluzione naturale

Altitudine massima	640	Altitudine minima	527
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	disforme
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	80
Grado evolutivo		Età prevalente	68
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3	Latifoglie varie	Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento a densità localmente disforme e struttura coetaneiforme

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Aggiornamento dati piano precedente
Classe di provvigione	
Altezza dominante	0
Diametro medio	0
Provvigione a ha	0
Incremendo medio	0
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	0 - 50 piante/ha
Altezza media	0
Area basimetrica ad ha	0
Provvigione totale	0

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	Numero

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	N. modulo intervento
Tipologia intervento	
Descrizione intervento	
Anno previsto per l'intervento	Intervento ripetitivo
Turno	
Etichetta	
Compresa	
Prescrizioni	
Uso forestale	Età prevalente
Provvigione ha	Provvigione ha all'anno
Ripresa ha anno	Classe di ripresa
Ripresa totale all'anno	Deroga LR39
Piano di utilizzazione	

Superficie totale ha	5.146752090475244

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	613	Altitudine minima	507
Pendenza media	50 - 60 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Sud

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	90
Grado evolutivo		Età prevalente	51
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	51 - 60
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	201-250 mc/ha
Altezza dominante	22
Diametro medio	22
Provvigione a ha	235
Incremendo medio	4.6
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	16
Area basimetrica ad ha	350
Provvigione totale	1209

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0350800069	Numero	00069

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	69	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2036	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Età prevalente	63
Provvigione ha	235	Provvigione ha all'anno	279
Ripresa ha anno	71	Classe di ripresa	51- 75 mc
Ripresa totale all'anno	368	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			

Superficie totale ha	1.76034502227694

Legge 39	Bosco (art. 3 comma 1)
Tipo fisionomico	
Tipo colturale	
Funzione	Produttiva
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione

Altitudine massima	576	Altitudine minima	441
Pendenza media	30 - 50 per cento		
Accessibilità	facile	Esposizione	Est

Anno ultimo intervento	

Copertura arbustiva	Media (tra il 20 e il 40 per cento di copertura)	Densità	normale
Esboscabilità	Facile	Coefficiente di copertura	100
Grado evolutivo		Età prevalente	68
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro	Classe di età	61 - 80
Composizione	Pura	Percentuale conifere	0
Categoria forestale	Cerrete	Percentuale latifoglie	100
Tipo forestale	Cerreta acidofila submediterranea a eriche	Numero ceppaie a	

MATRICINATURA

Entità		Distribuzione	
Specie A		Specie B	Roverella
Diffusione % specie A	0	Diffusione % specie	
Numero ad ha matricine nel primo turno			
Numero ad ha matricine in turni maggiori del			

RINNOVAZIONE

Rinnovazione	Assente		
Prima specie in rinnovazione		Seconda specie in rinnovazione	
Diffusione % prima specie	0	Diffusione % seconda specie	0
Posizione prima specie		Posizione seconda specie	
Distribuzione prima specie		Distribuzione seconda specie	
Stato vegetativo prima		Stato vegetativo seconda	
Specie principale 1	Cerro	Specie accessoria 1	
Specie principale 2	Roverella	Specie accessoria 2	
Specie principale 3		Specie accessoria 3	

Descrizione libera	Fustaia da invecchiamento di cerro

Istituzione in area 1	
Istituzione in area 2	
Istituzione in area 3	

PARAMETRI DENDROMETRICI

Modalità di determinazione dei parametri dendrometrici	Stimati
Classe di provvigione	251-300 mc/ha
Altezza dominante	22
Diametro medio	24
Provvigione a ha	290
Incremendo medio	4.2
Dati relativi all'intero soprassuolo	1
Numero piante ad ha	900 - 1200
Altezza media	17
Area basimetrica ad ha	38
Provvigione totale	210

DANNI

Tipo 1	Assenti	Specie o gruppi presenti	
Tipo 2		Entità	
Tipo 3		Distribuzione	
Entità 1	assenti	Tipo di danno	
Entità 2		Specie danneggiata 1	
Entità 3		Specie danneggiata 2	

CARATTERI AGRO-PASTORALI

Stato d'uso		Giacitura	
Facies da sovrapascolo		Opere di sistemazione sup	
Stato di manutenzione		Meccanizzabilità	
Marginabilità		Frammentazione	
Caratteristiche stazionali			
Tipologia vegetazione			
Specie principale 1		Specie principale 3	
Specie principale 2		Specie principale 4	
Dotazioni			
Gestione precedente			
Rilievo floristico			
Degrado			
Valore pastorale			
Sistema di pascolo			
Calcolo del carico			
Periodi di pascolamento			

CARATTERI ALTRE TIPOLOGIE USO DEL SUOLO

Descrizione libera	

INTERVENTI

chiaveINT	006A0350900074	Numero	00074

INTERVENTI FORESTALI o AGRO-PASTORALI

Numero entità	74	N. modulo intervento	001
Tipologia intervento	Tagli di diradamento		
Descrizione intervento	Diradamento in fustaie di latifoglie.		
Anno previsto per l'intervento	2038	Intervento ripetitivo	0
Turno			
Etichetta	DRDL		
Compresa	Fustaie di latifoglie in gestione ordinaria		
Prescrizioni			
Uso forestale	Fustaia da invecchiamento di ceduo di cerro >50	Età prevalente	82
Provvigione ha	316	Provvigione ha all'anno	367
Ripresa ha anno	94	Classe di ripresa	76-100 mc
Ripresa totale all'anno	165	Deroga LR39	0
Piano di utilizzazione			