

Report della provincia di Arezzo per olivo

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

Servizio fitosanitario



Provincia di Arezzo - Bollettino Olivo Integrato del 2026-08-27

Fenologia



In generale le condizioni di disponibilità idrica e temperature meno estreme hanno permesso alle piante di svolgere con più regolarità e continuità le attività fisiologiche con una miglior crescita delle drupe, seppur in modo disuniforme, la fase fenologica va da accrescimento drupe olive verdi a olive giallo-verdi.

Aspetti che con l'aumento della polpa incrementerà la possibilità e la facilità di ovodeposizione da parte della mosca nelle prossime settimane.

I dati dei monitoraggi evidenziano come l'andamento stagionale abbia reso molto difficili gli attacchi da insetti e patogeni, ma è necessario mantenere più elevato il livello di guardia per le prossime settimane, momento fondamentale per mantenere alta la qualità del prodotto finale. Infatti, un attacco di mosca a agosto/settembre in molte aree olivicole potrebbe rappresentare un danno, prevalentemente qualitativo.

Le temperature di questi ultimi sette giorni hanno visto ridimensionamenti piuttosto costanti nei valori minimi, mentre le massime hanno visto cali solo alcuni giorni. Valori massimi sono tornati su livelli elevati e così dovrebbero perdurare sino a lunedì prossimo. Successivamente dovrebbero calare ma con valori comunque superiori alle medie del periodo.

Occhio di pavone



OCCHIO DI PAVONE E CERCOSPORA

Le condizioni di pioggia, umidità e temperature inferiori ai trenta gradi creano condizioni favorevoli a vari funghi.

In particolare, negli oliveti dove è stata evidenziata presenza medio-elevata di occhio di pavone e cercospora nel corso dell'ultimo anno è opportuno eseguire un trattamento con prodotti rameici. I trattamenti rameici effettuati come repellenti per la mosca svolgono funzione fungicida.

Mosca delle olive



Il **contenimento** dovuto alle elevate temperature è in generale calo, spesso per valori decisamente più bassi spesso anche per il fatto che essendosi abbassate le temperature minime, i cumulati termici giornalieri sono inferiori.

Le **piogge** hanno, a varie riprese, interessato quasi tutte le aree olivicole e di conseguenza l'idratazione delle drupe sta migliorando, aspetto molto positivo per il corretto andamento dei processi di conversione degli zuccheri in olio e di maturazione in generale, ma anche per una maggior suscettibilità delle olive alla deposizione della mosca.

Nelle varie **analisi sui dati** completi appare evidente un'inversione del trend, seppur con valori positivi degli scostamenti, ma molto contenuti, in alcune province. Valutazione che si traduce in pochissime aree sopra soglia (a livello regionale) ma che evidenzia una ripresa dell'attività di ovodeposizione della mosca. Il perdurare delle condizioni favorevoli all'insetto può portare ad avere un aumento dell'infestazione.

Situazione provinciale

Nelle varie aree olivicole provinciali, i valori di mortalità teorica **settimanale** si sono portati in generale sotto al 50%, con aumento del rischio.

I dati del monitoraggio di questa settimana, inseriti al momento della stesura del bollettino, evidenziano ancora assenza di infestazione su tutto il territorio provinciale. Verificare sul database i dati della zona sud della provincia.

Consultare il database con i dati aggiornati.

https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/mod_aedita_dati#/tipo_elab/elab_pivot/section/ae/crop/2/year/2026/survey_schema/1/week/31/survey.
(https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/mod_aedita_dati#/tipo_elab/elab_pivot/section/ae/crop/2/year/2026/survey_schema/1/week/31/survey)

Vista la mortalità teorica in calo, l'aumento delle dimensioni delle olive e tenuto conto delle previsioni per i prossimi sette giorni è auspicabile intensificare i campionamenti aziendali.

Consigli difesa

Strategie attract and kill

Per chi ha scelto strategie attract and kill con cattura massale, verificare il corretto posizionamento e con campionamenti la tenuta del sistema.

Chi ha optato per prodotti con esche attrattive avvelenate, monitorare la situazione e prevedere trattamenti per il contenimento della popolazione degli adulti.

Strategie repellenti/antideponenti

Valutare la tenuta/copertura del prodotto usato.

Chi non lo avesse ancora fatto effettuare trattamenti con prodotti ad azione antideponenti/repellente: a questo punto può essere valutato un cambio di strategia ed utilizzare i rameici (con adesivante), così da sfruttare l'effetto combinato anche contro le infezioni fungine favorite da climi umido/piovosi. Inoltre, riducendosi le ore di luce si evita di limitare ulteriormente la capacità fotosintetica dell'apparato fogliare con gli schermanti.

Strategie in abbinamento

Le **strategie preventive** (sopra riportate) sono una concreta possibilità **anche per le aziende in integrato**, per poter ridurre l'ovodeposizione e mantenere la possibilità di uso di prodotti ovo-larvicida nel caso in cui i campionamenti delle olive evidenziassero la necessità per la gravità dell'attacco.

Strategie ovolarvicida

Ancor più dove i dati del monitoraggio evidenziano infestazione (seppur bassa) effettuare campionamenti delle olive.

Dove il monitoraggio di agroambiente o campionamenti aziendali (per sicurezza anche dove usato antideponenti o repellenti) dovessero rilevare infestazione superiore alla soglia del 5% di u+l1v trattare con prodotti a base di acetamiprid o flupiradifurone alle dosi e modalità riportate in etichetta.

NB nel portale è stato inserito un **nuovo parametro di infestazione** per sfruttare al meglio l'efficacia dei prodotti disponibili in integrato su uova e larve di prima età, è indicato con "u+l1v". Il parametro non considera le larve di seconda età come l'infestazione attiva usata in passato, che resta un riferimento valido per capire l'attività dell'insetto e sarà ancora utilizzato per le elaborazioni generali.

Note



In conformità al **Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**, accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature, rimuovere perdite e malfunzionamenti per poter tarare correttamente la distribuzione dei vari prodotti limitando le perdite.

Una difesa efficace passa anche da attrezzature ben mantenute e correttamente tarate.

Seguire attentamente le prescrizioni delle etichette dei prodotti fitosanitari, inclusi **dosaggi**, **numero** di trattamenti, **tempo di rientro** (per la tutela degli operatori) o **intervallo di sicurezza** (per la tutela del consumatore)

Provincia di Arezzo - Bollettino Olivo Biologico del 2026-08-27

Fenologia



In generale le condizioni di diponibilità idrica e temperature meno estreme hanno permesso alle piante di svolgere con più regolarità e continuità le attività fisiologiche con una miglior crescita delle drupe, seppur in modo disuniforme, la fase fenologica va da accrescimento drupe olive verdi a olive giallo-verdi.

Aspetti che con l'aumento della polpa incrementerà la possibilità e la facilità di ovodeposizione da parte della mosca nelle prossime settimane.

I dati dei monitoraggi evidenziano come l'andamento stagionale abbia reso molto difficili gli attacchi da insetti e patogeni, ma è necessario mantenere più elevato il livello di guardia per le prossime settimane, momento fondamentale per mantenere alta la qualità del prodotto finale. Infatti, un attacco di mosca a agosto/settembre in molte aree olivicole potrebbe rappresentare un danno, prevalentemente qualitativo.

Le temperature di questi ultimi sette giorni hanno visto ridimensionamenti piuttosto costanti nei valori minimi, mentre le massime hanno visto cali solo alcuni giorni. Valori massimi sono tornati su livelli elevati e così dovrebbero perdurare sino a lunedì prossimo. Successivamente dovrebbero calare ma con valori comunque superiori alle medie del periodo.

Occhio di pavone



OCCHIO DI PAVONE E CERCOSPORA

Le condizioni di pioggia, umidità e temperature inferiori ai trenta gradi creano condizioni favorevoli a vari funghi.

In particolare, negli oliveti dove è stata evidenziata presenza medio-elevata di occhio di pavone e cercospora nel corso dell'ultimo anno è opportuno eseguire un trattamento con prodotti rameici. I trattamenti rameici effettuati come repellenti per la mosca svolgono funzione fungicida.

Mosca delle olive



Il **contenimento** dovuto alle elevate temperature è in generale calo, spesso per valori decisamente più bassi spesso anche per il fatto che essendosi abbassate le temperature minime, i cumulati termici giornalieri sono inferiori.

Le **piogge** hanno, a varie riprese, interessato quasi tutte le aree olivicole e di conseguenza l'idratazione delle drupe sta migliorando, aspetto molto positivo per il corretto andamento dei processi di conversione degli zuccheri in olio e di maturazione in generale, ma anche per una maggior suscettibilità delle olive alla deposizione della mosca.

Nelle varie **analisi sui dati** completi appare evidente un'inversione del trend, seppur con valori positivi degli scostamenti, ma molto contenuti, in alcune province. Valutazione che si traduce in pochissime aree sopra soglia (a livello regionale) ma che evidenzia una ripresa dell'attività di ovodeposizione della mosca. Il perdurare delle condizioni favorevoli all'insetto può portare ad avere un aumento dell'infestazione.

Situazione provinciale

Nelle varie aree olivicole provinciali, i valori di mortalità teorica **settimanale** si sono portati in generale sotto al 50%, con aumento del rischio.

I dati del monitoraggio di questa settimana, inseriti al momento della stesura del bollettino, evidenziano ancora assenza di infestazione su tutto il territorio provinciale. Verificare sul database i dati della zona sud della provincia.

Consultare il database con i dati aggiornati.

https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/mod_aedita_dati#/tipo_elab/elab_pivot/section/ae/crop/2/year/2026/survey_schema/1/week/31/survey
(https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/mod_aedita_dati#/tipo_elab/elab_pivot/section/ae/crop/2/year/2026/survey_schema/1/week/31/survey)

Vista la mortalità teorica in calo, l'aumento delle dimensioni delle olive e tenuto conto delle previsioni per i prossimi sette giorni è auspicabile intensificare i campionamenti aziendali.

Consigli difesa

Strategie attract and kill

Per chi ha scelto strategie attract and kill con cattura massale, verificare il corretto posizionamento e con campionamenti la tenuta del sistema.

Chi ha optato per prodotti con esche attrattive avvelenate, monitorare la situazione e prevedere trattamenti per il contenimento della popolazione degli adulti.

Strategie repellenti/antideponenti

Valutare la tenuta/copertura del prodotto usato.

Chi non lo avesse ancora fatto effettuare trattamenti con prodotti ad azione antideponenti/repellente: a questo punto può essere valutato un cambio di strategia ed utilizzare i rameici (con adesivante), così da sfruttare l'effetto combinato anche contro le infezioni fungine favorite da climi umido/piovosi. Inoltre, riducendosi le ore di luce si evita di limitare ulteriormente la capacità fotosintetica dell'apparato fogliare con gli schermanti.

NB nel portale è stato inserito un **nuovo parametro di infestazione** per sfruttare al meglio l'efficacia dei prodotti disponibili in integrato su uova e larve di prima età, è indicato con "u+l1v". Il parametro non considera le larve di seconda età come l'infestazione attiva usata in passato, che resta un riferimento valido per capire l'attività dell'insetto e sarà ancora utilizzato per le elaborazioni generali.

Note



In conformità al **Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**, accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature, rimuovere perdite e malfunzionamenti per poter tarare correttamente la distribuzione dei vari prodotti limitando le perdite.

Una difesa efficace passa anche da attrezzature ben mantenute e correttamente tarate.

Seguire attentamente le prescrizioni delle etichette dei prodotti fitosanitari, inclusi **dosaggi**, **numero** di trattamenti, **tempo di rientro** (per la tutela degli operatori) o **intervallo di sicurezza** (per la tutela del consumatore)