

Report della provincia di Arezzo per vite

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

Servizio fitosanitario



Provincia di Arezzo - Bollettino Vite Integrato del 2026-08-27

Fenologia



La fase fenologica prevalente è "invaiaatura completa".

Peronospora



La difesa antiperonosporica può essere sospesa nei vigneti nei quali l'uva ha raggiunto la fase di invaiatura completa.

Botritis



Siamo nella fase di maggior suscettibilità a questa malattia. In previsione di piogge, innalzamento dell'umidità e in caso di grappoli danneggiati, è possibile intervenire con prodotti antibotritici microbiologici, bicarbonato di potassio o terpeni, sistemando in modo adeguato grappoli e vegetazione, eventualmente rimuovendo le foglie vicine ai grappoli che ne limitano l'areggiamento e l'adeguata bagnatura nei trattamenti.

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi

Oidio



E' possibile sospendere i trattamenti per le varietà prossime alla maturazione. Il rischio di nuove contaminazioni permane elevato sulle foglie.

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi

Black Rot



Con il completamento dell'invaiaatura, la fase di maggiore suscettibilità al black rot può considerarsi superata e la difesa specifica conclusa. Mantenere il monitoraggio solo negli appezzamenti con invaiatura incompleta o forte pressione della malattia.

Maturazione



In generale, l'inizio della vendemmia è previsto entro la prima metà di settembre. In alcune aree viticole, la vendemmia è già in corso.

Scaphoideus titanus



Per coloro che non hanno ancora provveduto, si consiglia di ritirare le trappole cromotropiche.

La difesa da *Scaphoideus titanus* può ritenersi conclusa. Nel caso in cui vengano osservati sintomi sospetti di Flavescenza dorata o altri Giallumi della vite, si consiglia di contattare il Servizio Fitosanitario Regionale (flavescenzadorata@regione.toscana.it) (<mailto:flavescenzadorata@regione.toscana.it>). E' consigliabile consultare i siti Flavescenza dorata: due nuove guide pratiche (<https://www.regione.toscana.it/-/flavescenza-dorata-due-nuove-guide-pratiche>) e Vite: nuovo Piano di Azione per la lotta alla Flavescenza dorata (<file:///C:/Users/crist/Downloads/Decreto%20n.8810%20del%2024-04-2026-%20Allegato%201.pdf>), dove è possibile trovare la Scheda A (https://www.agr.unipi.it/wp-content/uploads/2026/08/SchedaA_FD_2026.pdf) per la segnalazione di piante con sintomi attribuibili a Flavescenza dorata o ad altri Giallumi della vite.

Provincia di Arezzo - Bollettino Vite Biologico del 2026-08-27

Fenologia



La fase fenologica prevalente è "invaiaatura completa".

Peronospora



La difesa antiperonosporica può essere sospesa nei vigneti nei quali l'uva ha raggiunto la fase di invaiaatura completa.

Botritis



Siamo nella fase di maggior suscettibilità a questa malattia. In previsione di piogge, innalzamento dell'umidità e in caso di grappoli danneggiati, è possibile intervenire con prodotti antibotritici microbiologici, bicarbonato di potassio o terpeni, sistemando in modo adeguato grappoli e vegetazione, eventualmente rimuovendo le foglie vicine ai grappoli che ne limitano l'areggiamento e l'adeguata bagnatura nei trattamenti.

✚Prodotti ammessi biologico

✚Approfondimento

Oidio



E' possibile sospendere i trattamenti per le varietà prossime alla maturazione. Il rischio di nuove contaminazioni permane elevato sulle foglie.

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi biologico

Black Rot



Con il completamento dell'invaiaura, la fase di maggiore suscettibilità al black rot può considerarsi superata e la difesa specifica conclusa. Mantenere il monitoraggio solo negli appezzamenti con invaiatura incompleta o forte pressione della malattia.

Maturazione



In generale, l'inizio della vendemmia è previsto entro la prima metà di settembre. In alcune aree viticole, la vendemmia è già in corso.

Scaphoideus titanus



Per coloro che non hanno ancora provveduto, si consiglia di ritirare le trappole cromotropiche.

La difesa da *Scaphoideus titanus* può ritenersi conclusa. Nel caso in cui vengano osservati sintomi sospetti di Flavescenza dorata o altri Giallumi della vite, si consiglia di contattare il Servizio Fitosanitario Regionale (flavescenzadorata@regione.toscana.it) (<mailto:flavescenzadorata@regione.toscana.it>). E' consigliabile consultare i siti Flavescenza dorata: due nuove guide pratiche (<https://www.regione.toscana.it/-/flavescenza-dorata-due-nuove-guide-pratiche>) e Vite: nuovo Piano di Azione per la lotta alla Flavescenza dorata (<file:///C:/Users/crist/Downloads/Decreto%20n.8810%20del%2024-04-2026-%20Allegato%201.pdf>), dove è possibile trovare la Scheda A (https://www.agr.unipi.it/wp-content/uploads/2026/08/SchedaA_FD_2026.pdf) per la segnalazione di piante con sintomi attribuibili a Flavescenza dorata o ad altri Giallumi della vite.