

Report della provincia di Arezzo per olivo

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

Servizio fitosanitario



Provincia di Arezzo - Bollettino Olivo Integrato del 2026-10-01

Fenologia



L'andamento climatico delle ultime settimane si è assestato su giornate soleggiate con temperature sopra media, condizioni che hanno spinto i processi fisiologici della pianta a procedere velocemente: la **fase fenologica** è molto variabile ma la tendenza prevalente potrebbe essere riassunta da accrescimento drupe olive giallo-verdi a inizio invaiatura per le varietà precoci.

E' possibile scaricare i "Suggerimenti per la raccolta e lo stoccaggio delle olive 2026" (<https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/sites/default/files/consigli%20per%20la%20raccolta%20con%20una%20analisi%20piu%20dettagliata%20della%20situazione.pdf>) con una analisi più dettagliata della situazione.

Le informazioni aggiornate dalle varie province confermano l'avvio di frantoi nelle aree costiere da lunedì scorso e dalla prossima anche alcuni nelle province interne, dove il grosso partirà nella settimana dal 12 ottobre.

Occhio di pavone



OCCHIO DI PAVONE E CERCOSPORA

Provincia di Arezzo - Bollettino Olivo Biologico del 2026-10-01

Fenologia



L'andamento climatico delle ultime settimane si è assestato su giornate soleggiate con temperature sopra media, condizioni che hanno spinto i processi fisiologici della pianta a procedere velocemente: la **fase fenologica** è molto variabile ma la tendenza prevalente potrebbe essere riassunta da accrescimento drupe olive giallo-verdi a inizio invaiatura per le varietà precoci.

E' possibile scaricare i "Suggerimenti per la raccolta e lo stoccaggio delle olive 2026" (<https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/sites/default/files/consigli%20per%20la%20raccolta%20con%20una%20analisi%20piu%20dettagliata%20della%20situazione.pdf>) con una analisi più dettagliata della situazione.

Le informazioni aggiornate dalle varie province confermano l'avvio di frantoi nelle aree costiere da lunedì scorso e dalla prossima anche alcuni nelle province interne, dove il grosso partirà nella settimana dal 12 ottobre.

Occhio di pavone



OCCHIO DI PAVONE E CERCOSPORA

I trattamenti rameici effettuati eventualmente nelle scorse settimane come repellenti per la mosca svolgono anche funzione fungicida. Al moneto non trattare, evidenziare i campi con presenza di sintomi medio/forte.

Mosca delle olive



Le **analisi dei dati** (dove sono completi, dato che alcune province sono monitorate con tempistiche diverse ed è possibile consultare i dati aggiornati al link riportato di seguito) appare evidente un cambio di rotta, seppur lieve.

La settimana attuale (40) presenta aumenti nei valori medi provinciali rispetto alla precedente, più o meno marcati, nei vari territori provinciali ad eccezione delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Siena. Con un conseguente scostamento regionale leggermente positivo.

Seguire attentamente lo sviluppo meteo e fitosanitario della prossima settimana ed effettuare campionamenti aziendali per pianificare con precisione e consapevolezza il lavoro delle prossime settimane.

Situazione provinciale

I dati del monitoraggio aggiornati confermano anche per questa settimana, una generale assenza di infestazione (u+l1v) sul territorio provinciale. Fatta eccezione di Pian di Scò loc Campiglia 1% (stabile) a Bucine loc paese 1% (leggero aumento).

Viste le condizioni complessive e i localizzati aumenti nelle province limitrofe è auspicabile mantenere elevata l'attenzione ed effettuare campionamenti aziendali.

Consigli difesa

Strategie attract and kill

Per chi ha scelto strategie attract and kill con cattura massale, verificare il corretto posizionamento e con campionamenti (in particolare dove viene segnalata infestazione) la tenuta del sistema.

Chi ha optato per prodotti con esche attrattive avvelenate (da applicare sulla vegetazione), monitorare la situazione e prevedere trattamenti per il contenimento della popolazione degli adulti. Se compatibili con i tempi di raccolta e con l'intervallo di sicurezza dei prodotti usati, mantenere la copertura con intervalli in base al periodo di efficacia del prodotto usato e ripeterlo in caso di piogge dilavanti.

Strategie repellenti/antideponenti

Valutare la tenuta/copertura del prodotto usato, con campionamenti mirati.

Strategie in abbinamento

Le **strategie preventive** (sopra riportate), come meglio riportato precedentemente sono una concreta possibilità **anche per le aziende in integrato**, per poter ridurre l'ovodeposizione e mantenere la possibilità di uso di prodotti ovo-larvicida nel caso in cui i campionamenti delle olive evidenziassero la necessità per la gravità dell'attacco.

Strategie ovarlarvicida

Dove i dati del monitoraggio evidenziano infestazione (seppur bassa) effettuare campionamenti delle olive.

I trattamenti rameici effettuati eventualmente nelle scorse settimane come repellenti per la mosca svolgono anche funzione fungicida. Al moneto non trattare, evidenziare i campi con presenza di sintomi medio/forte.

Mosca delle olive



Le **analisi dei dati** (dove sono completi, dato che alcune province sono monitorate con tempistiche diverse ed è possibile consultare i dati aggiornati al link riportato di seguito) appare evidente un cambio di rotta, seppur lieve.

La settimana attuale (40) presenta aumenti nei valori medi provinciali rispetto alla precedente, più o meno marcati, nei vari territori provinciali ad eccezione delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Siena. Con un conseguente scostamento regionale leggermente positivo.

Seguire attentamente lo sviluppo meteo e fitosanitario della prossima settimana ed effettuare campionamenti aziendali per pianificare con precisione e consapevolezza il lavoro delle prossime settimane.

Situazione provinciale

I dati del monitoraggio aggiornati confermano anche per questa settimana, una generale assenza di infestazione (u+l1v) sul territorio provinciale. Fatta eccezione di Pian di Scò loc Campiglia 1% (stabile) a Bucine loc paese 1% (leggero aumento).

Viste le condizioni complessive e i localizzati aumenti nelle province limitrofe è auspicabile mantenere elevata l'attenzione ed effettuare campionamenti aziendali.

Consigli difesa

Strategie attract and kill

Per chi ha scelto strategie attract and kill con cattura massale, verificare il corretto posizionamento e con campionamenti (in particolare dove viene segnalata infestazione) la tenuta del sistema.

Chi ha optato per prodotti con esche attrattive avvelenate (da applicare sulla vegetazione), monitorare la situazione e prevedere trattamenti per il contenimento della popolazione degli adulti. Se compatibili con i tempi di raccolta e con l'intervallo di sicurezza dei prodotti usati, mantenere la copertura con intervalli in base al periodo di efficacia del prodotto usato e ripeterlo in caso di piogge dilavanti.

Strategie repellenti/antideponenti

Valutare la tenuta/copertura del prodotto usato, con campionamenti mirati.

Note



NOTE

Dove il monitoraggio regionale o i campionamenti aziendali (per sicurezza anche dove sono stati impiegati antideponenti/repellenti) dovessero rilevare infestazione superiore alla soglia del 5% di u+l1v è possibile:

- se sono rispettati i tempi di raccolta e gli intervalli di sicurezza, trattare con prodotti a base di acetamiprid o flupiradifurone alle dosi e modalità riportate in etichetta; - se l'infestazione (u+l1v) è composta solo da uova si può attendere settimana prossima e ripetere il campionamento;

- dove l'inizio della raccolta non permette di rispettare l'intervallo di sicurezza organizzare la raccolta in modo da portarla a termine più velocemente possibile.

- nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile suddividere i campi in modo da trattare con l'ovo-larvicida sopra riportato solo i campi che verranno raccolti più avanti nelle settimane rispettando intervallo di sicurezza e come in tutti gli altri casi il tempo di rientro del formulato utilizzato.

Sicurezza: Nella scelta dei prodotti scegliere con attenzione il prodotto più adatto e rispettare rigorosamente l'intervallo di sicurezza riportato in etichetta, che va dai 7 giorni (per un formulato di acetamiprid), 14 giorni (per il formulato a base di Flupiradifurone) ai 21 giorni (per altro formulato a base di Acetamiprid); quindi seguire l'etichetta del prodotto impiegato.

In conformità al **Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**, accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature, rimuovere perdite e malfunzionamenti per poter tarare correttamente la distribuzione dei vari prodotti limitando le perdite.

Una difesa efficace passa anche da attrezzature ben mantenute e correttamente tarate.

Seguire attentamente le prescrizioni delle etichette dei prodotti fitosanitari, inclusi **dosaggi**, **numero** di trattamenti, **tempo di rientro** (per la tutela degli operatori) o **intervallo di sicurezza** (per la tutela del consumatore). nelle etichette sono riportate anche le prescrizioni di distanza da corpi idrici e da zone non coltivate.

Note



NOTE

In conformità al **Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**, accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature, rimuovere perdite e malfunzionamenti per poter tarare correttamente la distribuzione dei vari prodotti limitando le perdite.

Una difesa efficace passa anche da attrezzature ben mantenute e correttamente tarate.

Seguire attentamente le prescrizioni delle etichette dei prodotti fitosanitari, inclusi **dosaggi**, **numero** di trattamenti, **tempo di rientro** (per la tutela degli operatori) o **intervallo di sicurezza** (per la tutela del consumatore). nelle etichette sono riportate anche le prescrizioni di distanza da corpi idrici e da zone non coltivate.