

## Report della provincia di Arezzo per olivo

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

Servizio fitosanitario



### Provincia di Arezzo - Bollettino Olivo Integrato del 2026-10-15

#### Fenologia



Le piogge cadute il 7-8 e in alcune aree della regione anche il 9 ottobre scorso hanno riequilibrato molto spesso lo stato idrico che in alcune aree aveva portato le piante ad essere in condizioni di stress accentuato.

Con il passaggio perturbato che ha portato le sopracitate piogge sono calati anche i valori termici, in particolare le massime, che si sono attestate finalmente sotto i 25°C. La **fase fenologica** procede in modo molto disuniforme e a **macchia di leopardo** con una situazione prevalente da accrescimento drupe olive giallo-verdi e invaiatura nelle varietà più precoci, ma aumentano in numero ed estensione le situazioni localizzate con invaiatura molto avanzata anche su varietà tipicamente più tardive. Non mancano situazioni di assenza di invaiatura anche dovute alla forte carica. Prestare molta attenzione anche alla maturazione della polpa che, anche non associata ad una colorazione esterna, potrebbe evidenziare significativi avanzamenti del complessivo stato delle olive. A conferma di ciò sono da evidenziare i dati di rese in frantoio che in generale sottolineano buoni contenuti in olio nelle drupe.

E' possibile scaricare i "Suggerimenti per la raccolta e lo stoccaggio delle olive 2026" (<https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/sites/default/files/consigli%20per%20la%20raccolta>) con una analisi più dettagliata della situazione.

### Provincia di Arezzo - Bollettino Olivo Biologico del 2026-10-15

#### Fenologia



Le piogge cadute il 7-8 e in alcune aree della regione anche il 9 ottobre scorso hanno riequilibrato molto spesso lo stato idrico che in alcune aree aveva portato le piante ad essere in condizioni di stress accentuato.

Con il passaggio perturbato che ha portato le sopracitate piogge sono calati anche i valori termici, in particolare le massime, che si sono attestate finalmente sotto i 25°C. La **fase fenologica** procede in modo molto disuniforme e a **macchia di leopardo** con una situazione prevalente da accrescimento drupe olive giallo-verdi e invaiatura nelle varietà più precoci, ma aumentano in numero ed estensione le situazioni localizzate con invaiatura molto avanzata anche su varietà tipicamente più tardive. Non mancano situazioni di assenza di invaiatura anche dovute alla forte carica. Prestare molta attenzione anche alla maturazione della polpa che, anche non associata ad una colorazione esterna, potrebbe evidenziare significativi avanzamenti del complessivo stato delle olive. A conferma di ciò sono da evidenziare i dati di rese in frantoio che in generale sottolineano buoni contenuti in olio nelle drupe.

E' possibile scaricare i "Suggerimenti per la raccolta e lo stoccaggio delle olive 2026" (<https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/sites/default/files/consigli%20per%20la%20raccolta>) con una analisi più dettagliata della situazione.

## Occhio di pavone



### OCCHIO DI PAVONE E CERCOSPORA

I trattamenti rameici effettuati eventualmente nelle scorse settimane come repellenti per la mosca svolgono anche funzione fungicida. Al moneto non trattare, evidenziare i campi con presenza di sintomi medio/forte.

## Mosca delle olive



Il monitoraggio in campo della mosca è alle battute finali e dati rilevati solo su parte di alcune province interne non evidenziano infestazioni significative, ma da controlli extra monitoraggio giungono segnalazioni di possibili localizzate ovodeposizioni negli ultimi 5/7 giorni.

Seguire attentamente lo sviluppo meteo e fitosanitario della prossima settimana ed effettuare campionamenti aziendali per pianificare con precisione e consapevolezza le varie operazioni.

**E' possibile che con le operazioni di raccolta e frangitura in corso siano comunque inseriti ulteriori dati consultabili sul database.**

[https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/mod\\_aedita\\_dati#/tipo\\_elab/elab\\_pivot/section/ae/c](https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/mod_aedita_dati#/tipo_elab/elab_pivot/section/ae/c)

### Consigli difesa

Dove le operazioni di raccolta sono avviate organizzarle in modo ottimale in funzione dei parametri di maturazione e qualità dell'olio rilevati.

### Strategie attract and kill

Per chi ha scelto strategie attract and kill con cattura massale o esche avvelenate, verificare con campionamenti la tenuta del sistema.

### Strategie repellenti/antideponenti

Valutare la tenuta/copertura del prodotto usato, con campionamenti mirati.

In caso di presenza di ovodeposizione accelerare le operazioni di raccolta rispettando il tempo di carenza (intervallo di sicurezza) dei prodotti fitosanitari eventualmente utilizzati in precedenza.

### Strategie in abbinamento

### Strategie ovaricida

Per chi è scoperto da strategie antideponenti repellenti effettuare campionamenti e se dovessero rilevare infestazione superiore alla soglia del 5% di u+1v è possibile:

- se l'infestazione (u+1v) è composta solo da uova si può attendere la settimana prossima e ripetere il campionamento;

- dove l'inizio della raccolta non permette di rispettare l'intervallo di sicurezza organizzare la raccolta in modo da portarla a termine più velocemente possibile.

## Occhio di pavone



### OCCHIO DI PAVONE E CERCOSPORA

I trattamenti rameici effettuati eventualmente nelle scorse settimane come repellenti per la mosca svolgono anche funzione fungicida. Al moneto non trattare, evidenziare i campi con presenza di sintomi medio/forte.

## Mosca delle olive



Il monitoraggio in campo della mosca è alle battute finali e dati rilevati solo su parte di alcune province interne non evidenziano infestazioni significative, ma da controlli extra monitoraggio giungono segnalazioni di possibili localizzate ovodeposizioni negli ultimi 5/7 giorni.

Seguire attentamente lo sviluppo meteo e fitosanitario della prossima settimana ed effettuare campionamenti aziendali per pianificare con precisione e consapevolezza le varie operazioni.

**E' possibile che con le operazioni di raccolta e frangitura in corso siano comunque inseriti ulteriori dati consultabili sul database.**

[https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/mod\\_aedita\\_dati#/tipo\\_elab/elab\\_pivot/section/ae/c](https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/mod_aedita_dati#/tipo_elab/elab_pivot/section/ae/c)

### Consigli difesa

Dove le operazioni di raccolta sono avviate organizzarle in modo ottimale in funzione dei parametri di maturazione e qualità dell'olio rilevati.

### Strategie attract and kill

Per chi ha scelto strategie attract and kill con cattura massale o esche avvelenate, verificare con campionamenti la tenuta del sistema.

### Strategie repellenti/antideponenti

Valutare la tenuta/copertura del prodotto usato, con campionamenti mirati.

In caso di presenza di ovodeposizione accelerare le operazioni di raccolta rispettando il tempo di carenza (intervallo di sicurezza) dei prodotti fitosanitari eventualmente utilizzati in precedenza.

## Note



### NOTE

In conformità al **Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**, accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature, rimuovere perdite e malfunzionamenti per poter tarare correttamente la distribuzione dei vari prodotti limitando le perdite.

Una difesa efficace passa anche da attrezzature ben mantenute e correttamente tarate.

- nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile suddividere i campi in modo da trattare con l'ovo-larvicida sopra riportato solo i campi che verranno raccolti più avanti **rispettando intervallo di sicurezza e il tempo di rientro** del formulato utilizzato.

**Sicurezza:** Nella scelta dei prodotti scegliere con attenzione il prodotto più adatto e rispettare rigorosamente l'intervallo di sicurezza riportato in etichetta, che va dai 7 giorni (per un formulato di acetamiprid), 14 giorni (per il formulato a base di Flupiradifurone) ai 21 giorni (per altro formulato a base di Acetamiprid); quindi seguire l'etichetta del prodotto impiegato.

Seguire attentamente le prescrizioni delle etichette dei prodotti fitosanitari, inclusi **dosaggi**, **numero** di trattamenti, **tempo di rientro** (per la tutela degli operatori) o **intervallo di sicurezza** (per la tutela del consumatore). nelle etichette sono riportate anche le prescrizioni di distanza da corpi idrici e da zone non coltivate.

## Note



### NOTE

In conformità al **Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**, accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature, rimuovere perdite e malfunzionamenti per poter tarare correttamente la distribuzione dei vari prodotti limitando le perdite.

Una difesa efficace passa anche da attrezzature ben mantenute e correttamente tarate.

Seguire attentamente le prescrizioni delle etichette dei prodotti fitosanitari, inclusi **dosaggi**, **numero** di trattamenti, **tempo di rientro** (per la tutela degli operatori) o **intervallo di sicurezza** (per la tutela del consumatore). nelle etichette sono riportate anche le prescrizioni di distanza da corpi idrici e da zone non coltivate.