

Report della provincia di Arezzo per frumento

← Settimana precedente

[AR](#) [FI](#) [GR](#) [LI](#) [LU](#) [MS](#) [PI](#) [PO](#) [PT](#) [SI](#)



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

Servizio fitosanitario

Agroambiente.info

Provincia di Arezzo - Bolletino Frumento del 2026-06-04

Fenologia



Nel frumento tenero i rilievi evidenziano la **maturazione piena** nelle varietà precoci, mentre le varietà medie e tardive si trovano in **maturazione cerosa**.

Nel frumento duro le varietà precoci sono in **maturazione piena**, mentre le varietà medie si trovano in **maturazione cerosa**.

Oidio



Non si rilevano sintomi di oidio nel frumento tenero e nel frumento duro in nessuna delle varietà considerate.

Ruggini



Ruggini (gialla e bruna).

Non si rilevano sintomi di ruggine gialla nel frumento tenero e nel frumento duro, mentre nel frumento tenero è rilevata presenza di ruggine bruna **media 5–25%** nelle varietà tardive, assente nelle altre varietà.

Septoria



Nel frumento tenero la septoria è **25 - grave** nelle varietà precoci, **alta >25%** nelle varietà medie e tardive. Nel frumento duro la septoria è assente nelle varietà precoci ed è **alta >25%** nelle varietà medie.

Fusariosi



Nel frumento tenero è riportata una presenza di fusariosi **5 - lieve** nelle varietà medie, mentre nelle varietà precoci e tardive non si rilevano sintomi.

Nel frumento duro è riportata una presenza di fusariosi **5 - lieve** nelle varietà medie, mentre nelle varietà precoci non si rilevano sintomi.

Rischio fusariosi da modello previsionale.

Sia nel frumento tenero che nel frumento duro il rischio fusariosi risulta **nullo** in tutte le varietà considerate.